

クラリスロマイシンDS 小児用10%「トーワ」の上手な飲ませ方

監修：獨協医科大学 小児科学 主任教授 吉原重美 先生

このお薬は抗生物質です。
医師または薬剤師の指示通りに服用してください。

このお薬の風味は…

- ・甘みをつけた「いちご風味」です。
- ・このお薬の粒には苦みを防ぐコーティングがされています。



水で飲ませるときは…

- ・少量の水（10～20cc）に1回分のお薬を加え、軽くかき混ぜてから飲ませてください。
- ・このお薬は、水に溶けませんが混ざります。
この水の量は目安です。好みに合わせて調節してください。



お薬を混ぜる場合…

- ・飲ませる直前に1回分を混ぜてください。
- ・混ぜたお薬は保管しないでください。

裏面もお読みください

クラリスロマイシンDS 小児用10%「トーワ」の上手な飲ませ方

監修：獨協医科大学 小児科学 主任教授 吉原重美 先生

このお薬は抗生物質です。
医師または薬剤師の指示通りに服用してください。

このお薬の風味は…

- ・甘みをつけた「いちご風味」です。
- ・このお薬の粒には苦みを防ぐコーティングがされています。



水で飲ませるときは…

- ・少量の水（10～20cc）に1回分のお薬を加え、軽くかき混ぜてから飲ませてください。
- ・このお薬は、水に溶けませんが混ざります。
この水の量は目安です。好みに合わせて調節してください。



お薬を混ぜる場合…

- ・飲ませる直前に1回分を混ぜてください。
- ・混ぜたお薬は保管しないでください。

裏面もお読みください

クラリスロマイシンDS 小児用10%「トーワ」の上手な飲ませ方

監修：獨協医科大学 小児科学 主任教授 吉原重美 先生

このお薬は抗生物質です。
医師または薬剤師の指示通りに服用してください。

このお薬の風味は…

- ・甘みをつけた「いちご風味」です。
- ・このお薬の粒には苦みを防ぐコーティングがされています。



水で飲ませるときは…

- ・少量の水（10～20cc）に1回分のお薬を加え、軽くかき混ぜてから飲ませてください。
- ・このお薬は、水に溶けませんが混ざります。
この水の量は目安です。好みに合わせて調節してください。



お薬を混ぜる場合…

- ・飲ませる直前に1回分を混ぜてください。
- ・混ぜたお薬は保管しないでください。

裏面もお読みください

クラリスロマイシンDS 小児用10%「トーワ」の上手な飲ませ方

監修：獨協医科大学 小児科学 主任教授 吉原重美 先生

このお薬は抗生物質です。
医師または薬剤師の指示通りに服用してください。

このお薬の風味は…

- ・甘みをつけた「いちご風味」です。
- ・このお薬の粒には苦みを防ぐコーティングがされています。



水で飲ませるときは…

- ・少量の水（10～20cc）に1回分のお薬を加え、軽くかき混ぜてから飲ませてください。
- ・このお薬は、水に溶けませんが混ざります。
この水の量は目安です。好みに合わせて調節してください。



お薬を混ぜる場合…

- ・飲ませる直前に1回分を混ぜてください。
- ・混ぜたお薬は保管しないでください。

裏面もお読みください


水で飲みにくいときは…

水のかわりに次のような飲み物や食べ物と一緒に飲むと、飲みやすくなります。



水で飲みにくいときは…

水のかわりに次のような飲み物や食べ物と一緒に飲むと、飲みやすくなります。



飲ませた後のポイント

- このお薬は甘く味つけされていますが、口の中に残ったお薬が苦くなることがあります。お薬を飲ませた後は、すぐに水を飲ませてあげるとよいでしょう。
- ココアやアイスクリームなどを口に含ませるのも、苦みを防ぐ良い方法です。

- このお薬は甘く味つけされていますが、口の中に残ったお薬が苦くなることがあります。お薬を飲ませた後は、すぐに水を飲ませてあげるとよいでしょう。
- ココアやアイスクリームなどを口に含ませるのも、苦みを防ぐ良い方法です。

次のようなものと一緒に飲むと、苦くなります。
お薬の服用前後に飲んでも、苦くなることがあります。



次のようなものと一緒に飲むと、苦になります。
お薬の服用前後に飲んでも、苦くなることがあります。



東和薬品株式会社

2023年10月改訂(DC003962_01)

東和薬品株式会社

2023年10月改訂(DC003962_01)

水で飲みにくいときは…

水のかわりに次のような飲み物や食べ物と一緒に飲むと、飲みやすくなります。



水で飲みにくいときは…

水のかわりに次のような飲み物や食べ物と一緒に飲むと、飲みやすくなります。



飲ませた後のポイント

- このお薬は甘く味つけされていますが、口の中に残ったお薬が苦くなることがあります。お薬を飲ませた後は、すぐに水を飲ませてあげるとよいでしょう。
- ココアやアイスクリームなどを口に含ませるのも、苦みを防ぐ良い方法です。

- このお薬は甘く味つけされていますが、口の中に残ったお薬が苦くなることがあります。お薬を飲ませた後は、すぐに水を飲ませてあげるとよいでしょう。
- ココアやアイスクリームなどを口に含ませるのも、苦みを防ぐ良い方法です。

次のようなものと一緒に飲むと、苦になります。
お薬の服用前後に飲んでも、苦なることがあります。



次のようなものと一緒に飲むと、苦になります。
お薬の服用前後に飲んでも、苦なることがあります。



東和薬品株式会社

2023年10月改訂(DC003962_01)

東和薬品株式会社

2023年10月改訂(DC003962_01)