
ピコスルファートNa内用液0.75%「トーワ」の服用のしかた

下剤

●このお薬は通常１日１回寝る前にコップ１杯の水などに滴下して服用して下さい。

●右図のように容器の胴をゆっくり押して１滴ずつ滴下して下さい。



１日１回　　滴

〔ご　注　意〕
目には入れないで下さい。

●医師・薬剤師に指示された滴数を必ず滴下して服用して下さい。

東和薬品株式会社


2022年6月改訂（C-7）
DC-002483_01

ピコスルファートNa内用液0.75%「トーワ」の服用のしかた

下剤

●このお薬は通常１日１回寝る前にコップ１杯の水などに滴下して服用して下さい。

●右図のように容器の胴をゆっくり押して１滴ずつ滴下して下さい。



１日１回　　滴

〔ご　注　意〕
目には入れないで下さい。

●医師・薬剤師に指示された滴数を必ず滴下して服用して下さい。

東和薬品株式会社


2022年6月改訂（C-7）
DC-002483_01

ピコスルファートNa内用液0.75%「トーワ」の服用のしかた

下剤

●このお薬は通常１日１回寝る前にコップ１杯の水などに滴下して服用して下さい。

●右図のように容器の胴をゆっくり押して１滴ずつ滴下して下さい。



１日１回　　滴

〔ご　注　意〕
目には入れないで下さい。

●医師・薬剤師に指示された滴数を必ず滴下して服用して下さい。

東和薬品株式会社


2022年6月改訂（C-7）
DC-002483_01

ピコスルファートNa内用液0.75%「トーワ」の服用のしかた

下剤

●このお薬は通常１日１回寝る前にコップ１杯の水などに滴下して服用して下さい。

●右図のように容器の胴をゆっくり押して１滴ずつ滴下して下さい。



１日１回　　滴

〔ご　注　意〕
目には入れないで下さい。

●医師・薬剤師に指示された滴数を必ず滴下して服用して下さい。

東和薬品株式会社

2022年6月改訂（C-7）
DC-002483_01