

アミオダロン塩酸塩錠100mg「トーア」 を服用される患者さんへ

指導・監修

聖マリアンナ医科大学病院

病院長 三宅良彦先生（循環器内科 教授）

このお薬の服用について

- このお薬は、不整脈の治療薬です。
- 飲み始めてから効き始めるのに、1～2週間かかります。
- 症状が良くなつた場合でも、ご自分の判断でお薬を減らしたり、飲むのを止めたりせず、医師の指示に従ってください。
- このお薬に特有の副作用が出る場合がありますので、医師の指示に従って定期的な診察・検査を受けてください。
- また、もともとの病気によっても動悸（どうき：どきどきすること）や息切れが悪くなることもありますので、症状が変化したら医師または薬剤師に相談してください。



実物大

次のお薬とは一緒に飲まないでください

このお薬には、一緒に飲んではいけないお薬（下表参照）があります。すでに他のお薬を飲んでいる方は、必ず医師または薬剤師に伝えてください。
今後、他のお薬を飲む場合にも、必ず事前に医師に申し出てください。

成分名
リトナビル
サキナビルメシリ酸塩
インジナビル硫酸塩エタノール付加物
ネルフィナビルメシリ酸塩
スバルフロキサシン
モキシフロキサシン塩酸塩
バルデナフィル塩酸塩水和物
シルデナフィルクエン酸塩
トレミフェンクエン酸塩
テラプレビル
フィンゴリモド塩酸塩
エリグルスタット酒石酸塩

裏面もお読みください。

このお薬特有の副作用を防ぐため、次の点に注意してください

次のような症状が認められたら、医師または薬剤師に申し出てください。



- 動悸(どうき)がひどい
- 血の気が引く感じがある
- めまい・ふらつき・失神




- 空咳(からせき)が増えた
- 息切れがする
- 熱がつづく



- 食欲がわからない
- 全身がだるい
- 皮膚や白目が黄色くなる

主治医の指示に従って、定期的に次のような検査を受けてください。

- 心電図測定
- 胸部レントゲン撮影
- 血液検査
- 尿検査
- 肺機能検査
- 眼科検査
(視力測定、細隙燈検査)



お薬は1カ所の薬局でもらいましょう

このお薬には一緒に飲むのがむずかしいお薬がありますので、薬局は一カ所に決めてください。

施設名



東和薬品株式会社

2015年12月改訂(C-3)