

シクロスポリン「トワ」 を服用される方へ

注意：以下の場合には必ず医師に相談してください

- 薬を服用して発疹などが出たことがある。
- ほかに薬を服用している。(薬局・薬店で買った薬も)
- 妊娠または授乳中である。
- 最近予防接種を受けた、もしくは予防接種を受ける予定がある。

服用について

- 服用方法**：服用する直前に薬を包装(PTPシート)から取り出してください。また、必ず指示に従い、指定された数のカプセルをコップ1杯の水またはぬるま湯といっしょに服用してください。
- 服用し忘れた場合**：気がついた時にできるだけ早く1回分を服用してください。ただし、次の服用まで5時間以上間隔をあけてください。
絶対に2回分をまとめて1度には服用しないでください。

- 併用での注意**：この薬を服用しているときにグレープフルーツジュース等*を飲むと、この薬の効き目が強く出ることが知られていますので、避けてください。

*一部のかんきつ類(グレープフルーツ、ブンタン、スウィーティーなど)には、この薬の効き目を強める成分が含まれていますので、なるべく食べることは避けてください。

セイヨウオトギリソウ(セント・ジョーンズ・ワート)を含む健康食品といっしょに服用すると、この薬の効き目が弱くなることが知られていますので、避けてください。



- 誤って多く服用した場合**：すぐに医師または薬剤師に相談してください。
- 高齢者の方へ**：特に指示を守って服用してください。
- その他**：医師の指示なしに、自分の判断で服用を止めたり、この薬のかわりにサンディミュン®を服用しないでください。

裏面も必ずお読みください。▶

服用期間中の注意

この薬は以下の薬と一緒に服用することはできません。これらの薬を服用している場合や、あるいはこれらの薬を処方された場合は必ず医師または薬剤師にお知らせください。



薬剤名(一般名)等

●生ワクチン

(乾燥弱毒生麻しんワクチン、乾燥弱毒生風しんワクチン、経口生ポリオワクチン、乾燥BCG等)

●プログラフ®/グラセプター®(タクロリムス) (外用剤を除く)

●リバロ®(ピタバスタチン)

●クレストール®(ロスバスタチン)

●トラクリア®(ボセンタン)

●ラジレス®(アリスキレン)

●スンベプラ®(アスナプレビル)

●ジメンシー®(ダクラタスビル/アスナプレビル/ベクラブビル)

●バニヘップ®(バニプレビル)

●グラジナ®(グラゾプレビル)

●パルモディア®(ペマフィブラート)

保管上の注意

- 服用直前まで、薬を包装(PTPシート)のまま保管してください。薬を包装(PTPシート)から取り出したままにすると、カプセルが柔らかくなったり、カプセル内に含まれている成分が蒸発することがあります。
- 車の中や、高温になる場所を避けて保管してください。
- 直射日光の当たらない涼しいところに、湿気を避けて保管してください。
- 子どもの手の届かないところに保管してください。

東和薬品株式会社