

# ドネペジル 塩酸塩内用液「トーワ」


を服用される方とご家族・介護者の方へ

梅風味の甘いお薬です。医師の指示通りに飲んでください。

## 開け方

図のように「押さえる」マークを持って開封口から開けてください。  
(開けにくい場合ははさみで開封してください。)

他の部分を持って開けると中身が飛び出ることがあります。




## 飲み方

- スプーンやカップに移して飲む場合  
飲む直前に移してください。

端を軽く押すと  
お薬が出やすくなります。

- 直接、開け口から飲む場合  
開け口から直接飲む場合は、切り口で  
口の中を傷つけないように注意してください。



※そのまま飲みづらい場合は、水等と混ぜて飲むこともできます。

### 誤嚥\*を防ぐために…

この薬を飲むときは、寝たままの状態で飲まないように、体を起こしてください。起き上がるこれが困難な場合は、少し上体を起こして飲んでください。

\*飲食物や薬が気管に入り、むせること

# ドネペジル 塩酸塩内用液「トーア」

## このお薬について

認知症の症状の進行を遅らせるお薬です。

症状に変化が見られなくても、患者さん本人や家族の判断で服用を中止したり、量を変更したりせず、医師の指示通りに飲んでください。

## 気をつけていただきたい症状

お薬の飲み始めや量が増えた時に、食欲不振、吐き気、下痢、また興奮して怒りっぽくなることがあります。このような症状に気づいたら、医師または薬剤師に相談してください。

## 飲み忘れた時

お薬を飲み忘れた場合は気づいたときにすぐに飲んでください。ただし、飲むべき時間から半日以上経過している場合は、1回分をとばして、次から指示通りに飲んでください。2回分を一度に飲まないでください。

## 飲みすぎた時

すみやかに医師または薬剤師に相談してください。

## 保管

子どもの手の届かないところに保管してください。

高温を避けて保管してください。

このほかにも、気になることやわからないことがある場合は、医師または薬剤師に相談してください。

施設名