

パロキセチン錠「トーワ」を服用される患者さんとご家族の方へ


このお薬について

- このお薬は、効果が現れ始めるまである程度日数がかかることがあります。十分な効果を得るために、途中でやめたりせず医師の指示通りに飲んでください。
- このお薬は、人によっては飲み始めの頃に、吐き気をもよおすことがあります。多くの場合、吐き気は次第に軽くなりますので、ご自分の判断で飲むのをやめたりせず、医師または薬剤師に相談してください。



このお薬の飲み方

このお薬はかみ碎かずに、コップ1杯の水またはぬるま湯と一緒に飲んでください。
(かみ碎くと苦味があります。)



裏面もご覧ください。

このお薬の注意点

このお薬を飲む際には、以下の点に特に注意してください。

また、気になることやわからないことがある場合は、医師または薬剤師に相談してください。

- 18歳未満の大うつ病性障害のある人がこの薬を飲んだ場合、有効性が確認できなかったとの報告や、死にたいという気持ちを強めるとの報告があります。18歳未満の大うつ病性障害の患者さんとご家族の方は、医師と十分に相談してください。
- このお薬を飲んでいる間、特に飲み始めや飲む量を変更したときに、不安感が強くなり死にたいと思うことがあります。
また、イライラして人に対して攻撃的になったりすることがあります。
ご自身の状態に変化を感じた場合には、ご家族や医師または薬剤師に相談してください。
ご家族の方は、患者さんの状態の変化について観察し、変化が見られた場合には医師または薬剤師に相談してください。
- このお薬は、人によっては眠くなることがあります。お薬を飲んだ後は、自動車の運転など危険を伴う機械の操作は避けてください。
- ほかのお薬を飲んでいる場合は、薬局・薬店で買ったお薬も含め、医師または薬剤師に相談してください。



東和薬品株式会社