

ピタバスタチンCa錠「トーワ」 を服用される患者さんへ

この薬について

この薬は、高コレステロール血症の治療薬です。

肝臓でのコレステロール合成を阻害することにより、血液中のコレステロールを低下させます。

この薬を飲むときは、以下の点にご注意ください

1. 筋肉の副作用として、ごくまれに横紋筋融解症を起こすことがあります。

● 飲み始めてから、筋肉が痛い、手足の力が入らない、尿の色が濃い(赤褐色になる)等の症状に気づかれた場合は、すぐに医師または薬剤師に連絡してください。
服用量が増えた方は特にご注意ください。

おうもんきんゆうかいじょう

横紋筋融解症とは

筋肉障害により、手足や全身の筋肉痛、しびれや脱力(感)などの症状があらわれ、筋肉の成分(ミオグロビン)が血液中に流れ出る病気です。また、尿の色が濃く、赤褐色の尿がみられることがあります。

これらの症状を放置しますと腎臓の機能が低下し、尿が出にくくなることもあります。

- 副作用はどんな薬にもありますが、早期に発見し適切な処置を行えば大事に至ることはほとんどありません。
- 他にも薬を服用して体調がおかしいと感じたら、医師または薬剤師に相談してください。

2. 医師に指示された用法・用量を守ってください。

- 飲み忘れた場合は、気がついた時にできるだけ早く1回分を飲んでください。
絶対に2回分を一度に飲まないでください。
- 誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。

その他の注意点

- 光の当たらない涼しいところに、湿気を避けて保管してください。
- 誤って飲んでしまわないよう、子どもの手の届かないところに保管してください。

施設名



東和薬品株式会社