

プラミペキソール塩酸塩 OD錠「トーフ」 を服用される患者さんにご家族の方へ

このお薬を正しく服用するため、飲む前に必ずお読みください。

- 飲み方は、必ず医師の指示に従ってください。
自分の判断で飲む量を減らしたり、飲むのを止めないでください。
- このお薬を飲むと、眠くなったり、前兆もなく急に眠り込んでしまうこと（突発的睡眠）、まためまいや立ちくらみ、ふらつき、失神が起ることがあります。

このお薬を飲んでいるときは、
自動車の運転、危険を伴う機械の操作、
高い所での作業などは避けてください。



突発的睡眠について

食事中や会話の最中などに急に眠り込んでしまうことがあります。また、このような症状は、お薬を飲み始めて1年以上経過してから見られる場合もあります。

- 衝動制御障害（病的賭博、病的性欲亢進、強迫性購買、暴食等）
や、以下のようなことが起こったら、すぐに医師または薬剤師に
連絡してください。

衝動制御障害

社会的に不利な結果を招くにもかかわらず、
ギャンブルや過剰で無計画な買い物を持続的に繰り返したり、病的に性欲や食欲が亢進したりすること。

- 急激な眠り込み
- 幻覚や妄想
- めまいや立ちくらみ
- 発熱や意識がぼんやりした状態
- 筋肉のこわばりがひどい状態



裏面もお読みください

このお薬は水なしでも飲むことができる口腔内崩壊錠(OD錠)です。

0.125mg



0.5mg



普通のお薬と同様に、水またはぬるま湯で飲むこともできます。

水なしで飲む場合

- 舌の上でだ液を含ませ軽くつぶしてから、だ液と一緒に飲み込んでください。
- 水で飲んだ場合と効き目は変わりません。
- 水なしで寝たまま飲まないでください。
(お薬が食道に引っかかり炎症を起こすおそれがあります。)

その他の注意点

- お薬を飲み忘れた場合は気がついたときにすぐに飲んでください。ただし、次に飲む時間が近いときは、1回とばしてください。絶対に2回分を1度に飲まないでください。
- こどもの手の届かないところに保管してください。
- 光の当たらない涼しいところに、湿気を避けて保管してください。
- 気になることやわからないことがある場合は、医師または薬剤師に相談してください。

施設名

