

レボフロキサシンOD錠 250mg 500mg「トーワ」

を服用される患者さんへ

この薬には、感染症の原因である細菌の増殖をおさえ、殺菌する働きがあります。

この薬は**「1日1回」**服用することで、感染症の原因菌を速く消失させ、症状を早く改善することが期待できます。

1日1回

服用にあたっての注意事項

- 抗菌薬は医師または薬剤師の指示どおりに服用しなかった場合、感染症が治らなかったり、次に感染症にかかったときに治りにくくなる可能性もあります。
- 飲み忘れに気づいた場合は、できるだけ早く服用してください。ただし、次の服用時間に近い場合は、忘れた分は服用せず、次回から服用するようにしてください。**絶対に2回分をまとめて1度に服用しないでください。**
- 誤って多く服用した場合は、すぐに医師または薬剤師に相談してください。
- 医師または薬剤師の指示なしに、自分の判断で量や回数を変更したり、服用を中止しないでください。

このほかにも、気になることやわからぬことがある場合は、医師または薬剤師に相談してください。

裏面もお読みください。

レボフロキサシンOD錠 250mg 500mg「トーワ」

を服用される患者さんへ

この薬には、感染症の原因である細菌の増殖をおさえ、殺菌する働きがあります。

この薬は**「1日1回」**服用することで、感染症の原因菌を速く消失させ、症状を早く改善することが期待できます。

1日1回

服用にあたっての注意事項

- 抗菌薬は医師または薬剤師の指示どおりに服用しなかった場合、感染症が治らなかったり、次に感染症にかかったときに治りにくくなる可能性もあります。
- 飲み忘れに気づいた場合は、できるだけ早く服用してください。ただし、次の服用時間に近い場合は、忘れた分は服用せず、次回から服用するようにしてください。**絶対に2回分をまとめて1度に服用しないでください。**
- 誤って多く服用した場合は、すぐに医師または薬剤師に相談してください。
- 医師または薬剤師の指示なしに、自分の判断で量や回数を変更したり、服用を中止しないでください。

このほかにも、気になることやわからぬことがある場合は、医師または薬剤師に相談してください。

裏面もお読みください。

レボフロキサシンOD錠 250mg 500mg「トーワ」

を服用される患者さんへ

この薬には、感染症の原因である細菌の増殖をおさえ、殺菌する働きがあります。

この薬は**「1日1回」**服用することで、感染症の原因菌を速く消失させ、症状を早く改善することが期待できます。

1日1回

服用にあたっての注意事項

- 抗菌薬は医師または薬剤師の指示どおりに服用しなかった場合、感染症が治らなかったり、次に感染症にかかったときに治りにくくなる可能性もあります。
- 飲み忘れに気づいた場合は、できるだけ早く服用してください。ただし、次の服用時間に近い場合は、忘れた分は服用せず、次回から服用するようにしてください。**絶対に2回分をまとめて1度に服用しないでください。**
- 誤って多く服用した場合は、すぐに医師または薬剤師に相談してください。
- 医師または薬剤師の指示なしに、自分の判断で量や回数を変更したり、服用を中止しないでください。

このほかにも、気になることやわからぬことがある場合は、医師または薬剤師に相談してください。

裏面もお読みください。

レボフロキサシンOD錠 250mg 500mg「トーワ」

を服用される患者さんへ

この薬には、感染症の原因である細菌の増殖をおさえ、殺菌する働きがあります。

この薬は**「1日1回」**服用することで、感染症の原因菌を速く消失させ、症状を早く改善することが期待できます。

1日1回

服用にあたっての注意事項

- 抗菌薬は医師または薬剤師の指示どおりに服用しなかった場合、感染症が治らなかったり、次に感染症にかかったときに治りにくくなる可能性もあります。
- 飲み忘れに気づいた場合は、できるだけ早く服用してください。ただし、次の服用時間に近い場合は、忘れた分は服用せず、次回から服用するようにしてください。**絶対に2回分をまとめて1度に服用しないでください。**
- 誤って多く服用した場合は、すぐに医師または薬剤師に相談してください。
- 医師または薬剤師の指示なしに、自分の判断で量や回数を変更したり、服用を中止しないでください。

このほかにも、気になることやわからぬことがある場合は、医師または薬剤師に相談してください。

裏面もお読みください。

この薬は口腔内崩壊錠（OD錠）です。

この薬は、水でくずれやすくなっています。
舌の上で水を含ませ軽くつぶしてから、**水と一緒に飲み込んでください。**

水なしで飲むこともできますが、その際は下記にご注意ください。

- 舌の上でだ液を含ませ軽くつぶしてから、だ液と一緒に飲み込んでください。
- 水で飲んだ場合と効き目は変わりません。
- 水なしで寝たまま飲まないでください。
(薬が食道に引っかかり炎症を起こすおそれがあります。)
- 苦みが残ってしまう場合には、水を飲んでください。

その他の注意点

- ・光の当たらない涼しいところに、湿気を避けて保管してください。
- ・誤って飲んでしまわないよう、子どもの手の届かないところに保管してください。

施設名

 東和薬品株式会社

2014年12月作成(C-1)

この薬は口腔内崩壊錠（OD錠）です。

この薬は、水でくずれやすくなっています。
舌の上で水を含ませ軽くつぶしてから、**水と一緒に飲み込んでください。**

水なしで飲むこともできますが、その際は下記にご注意ください。

- 舌の上でだ液を含ませ軽くつぶしてから、だ液と一緒に飲み込んでください。
- 水で飲んだ場合と効き目は変わりません。
- 水なしで寝たまま飲まないでください。
(薬が食道に引っかかり炎症を起こすおそれがあります。)
- 苦みが残ってしまう場合には、水を飲んでください。

その他の注意点

- ・光の当たらない涼しいところに、湿気を避けて保管してください。
- ・誤って飲んでしまわないよう、子どもの手の届かないところに保管してください。

施設名

 東和薬品株式会社

2014年12月作成(C-1)

この薬は口腔内崩壊錠（OD錠）です。

この薬は、水でくずれやすくなっています。
舌の上で水を含ませ軽くつぶしてから、**水と一緒に飲み込んでください。**

水なしで飲むこともできますが、その際は下記にご注意ください。

- 舌の上でだ液を含ませ軽くつぶしてから、だ液と一緒に飲み込んでください。
- 水で飲んだ場合と効き目は変わりません。
- 水なしで寝たまま飲まないでください。
(薬が食道に引っかかり炎症を起こすおそれがあります。)
- 苦みが残ってしまう場合には、水を飲んでください。

その他の注意点

- ・光の当たらない涼しいところに、湿気を避けて保管してください。
- ・誤って飲んでしまわないよう、子どもの手の届かないところに保管してください。

施設名

 東和薬品株式会社

2014年12月作成(C-1)

この薬は口腔内崩壊錠（OD錠）です。

この薬は、水でくずれやすくなっています。
舌の上で水を含ませ軽くつぶしてから、**水と一緒に飲み込んでください。**

水なしで飲むこともできますが、その際は下記にご注意ください。

- 舌の上でだ液を含ませ軽くつぶしてから、だ液と一緒に飲み込んでください。
- 水で飲んだ場合と効き目は変わりません。
- 水なしで寝たまま飲まないでください。
(薬が食道に引っかかり炎症を起こすおそれがあります。)
- 苦みが残ってしまう場合には、水を飲んでください。

その他の注意点

- ・光の当たらない涼しいところに、湿気を避けて保管してください。
- ・誤って飲んでしまわないよう、子どもの手の届かないところに保管してください。

施設名

 東和薬品株式会社

2014年12月作成(C-1)