

レトロゾール錠「トーフ」を 服用される患者さんへ



(原寸大)

この薬は、乳がんの増殖を抑える
治療薬です。毎日服用を続ける
ことが大切です。

服用方法

- 主治医の指示に従い、1日1錠を毎日飲んでください。
- 薬は包装(PTPシート)から取り出して、コップ1杯くらいの水と一緒に飲んでください。

飲み忘れた場合

- 飲み忘れた場合は、気がついたときにすぐに飲んでください。ただし、次の服用時間が近い場合は、1回分をとばして次の通常の服用時間に1回分を飲むようにしてください。**絶対に2回分を一度に飲まないでください。**

その他

- 主治医の指示なしに、ご自身の判断で薬を減らしたり、止めたりしないでください。
- こどもの手の届かないところに保管してください。
- 直射日光の当たらない、涼しいところに、湿気を避けて保管してください。

裏面もお読みください

副作用について

この薬を服用していると、下記のような副作用があらわれることがあります。

関節痛

- 手指のこわばり(関節が硬く感じる、関節が腫れぼったく動かしにくい)があらわれる。
- 手首、ひじ、肩、膝などの関節が痛む。

ほてり

- 突然からだが熱くなる。
- 汗をかいたり、顔が赤くなる。

骨粗鬆症

- 骨が脆くなり、骨折しやすくなる。

吐き気

- 気持ち悪くなる。
- 吐き気があらわれる。

頭痛

- 頭が痛くなる。

このほかにも気になる症状がありましたら、
主治医や薬剤師に相談してください。

施設名

