

テルビナフィン錠125mg「トーワ」

を服用される患者さんへ

この薬を正しく飲んで、治療を続けていただくために、必ずお読みください。

テルビナフィン錠125mg「トーワ」のはたらき

この薬は、真菌（カビの一種）の細胞膜合成を妨げることにより、真菌の増殖を抑える薬です。真菌による皮膚の病気で皮膚の深いところや爪にできるもの、ひどい水虫やタムシなどを治療します。

次のような方はこの薬を飲み始める前に必ず担当の医師または薬剤師に伝えてください。

- 今までに薬を使用して、かゆみ、発疹などアレルギー症状の出了ことがある方。
- 肝障害(肝不全、肝炎、胆汁うっ滯、黄疸など)がある方。
- 血液の病気(汎血球減少、無顆粒球症、血小板減少など)がある方。
- 妊娠または授乳中の方。
- ほかに薬を使用している方(薬局・薬店で購入した薬も含めて)。

中面以降もお読みください。

薬の飲み方

- 必ず指示された服用方法にしたがって、シートから取り出してコップ1杯程度の水またはぬるま湯で飲んでください。
- 薬を飲み忘れた場合は、気がついたときにすぐに飲んでください。ただし、次に飲む時間が近い場合は1回分とばして、次に飲む時間に1回分を飲んでください。
2回分を一度に飲まないでください。
- 誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。医師の指示なしに、自分の判断で飲むのを止めないでください。



正しく服用してください

薬を飲み始めてからこんな症状はありませんか？

薬を飲み始めてから以下のような症状があらわれたら副作用の初期症状である可能性があります。このような場合には、すぐに医師の診察を受けてください。

- 風邪のような症状：発熱、のどが痛い、体がだるい
- 皮膚や目の症状：皮膚や目が黄色い、発疹、皮膚が赤くなる
- 消化器（お腹や胃）の症状：吐き気、食欲不振、腹痛、下痢
- 脱力感や筋肉痛など：手足の力が入らない、筋肉が痛い、尿の色が濃い
- 頭痛やめまいなど：頭痛、めまい、眠気、ふらつき
- 味覚がおかしい：味がわからない、食べ物の味が苦くなる

※ほかにも何か気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

この薬を正しく飲んでいただくために、定期的に血液をとって検査をおこないます。

- この薬を飲むと少数ですが、肝臓や血液に影響を認められる方がいます。これを早期に発見するため、少量の血液をとて肝臓や血液のはたらきを調べる検査をおこないます。
- 検査はまずこの薬を飲む前に実施し、飲み始めてから2ヵ月間は月に1回おこないます。その後も、定期的に検査を受けてください。

検査日

この薬を飲み始めてから 2 カ月間は月に 1 回の検査を受けるために受診しましょう。

1回目 (投与前)	年 月 日
2回目 (1カ月後)	年 月 日
3回目 (2カ月後)	年 月 日
回目 ()	年 月 日
回目 ()	年 月 日
回目 ()	年 月 日

施設名



東和薬品株式会社

2015年6月改訂(C-3)