

使用上の注意改訂のお知らせ

2016年2月
東和薬品株式会社

Ca拮抗剤

ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「トーフ」 ジルチアゼム塩酸塩錠60mg「トーフ」

《ジルチアゼム塩酸塩錠》

このたび、標記製品の「使用上の注意」を改訂致しましたのでお知らせ申し上げます。
なお、改訂添付文書を封入した製品がお手元に届くまでには日数を要する場合がございますので、
今後のご使用に際しましては、下記内容にご留意くださいますようお願い申し上げます。

1. 改訂内容

改訂後（下線部改訂）			改訂前		
3. 相互作用 併用注意（併用に注意すること）			3. 相互作用 併用注意（併用に注意すること）		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
アピキサバン	アピキサバンの作用が 増強することがある。 定期的に臨床症状を 観察し、異常が認め られた場合には減量 若しくは投与を中止 する。	これらの薬剤の代 謝酵素（チトクロ ームP450）を阻害 することにより、こ れらの薬剤の血中 濃度を上昇させると 考えられる。			（記載なし）

該当項目のみ記載

2. 改訂理由

「相互作用 併用注意」の項（自主改訂）

相手薬剤と整合性をとるため、「相互作用 併用注意」の項を改訂し、注意喚起致しました。

今回の改訂内容につきましては、日本製薬団体連合会の医薬品安全対策情報（DSU）No. 247（2016年3月）に掲載される予定です。

また、改訂後の添付文書全文につきましては、独立行政法人 医薬品医療機器総合機構のホームページ（<http://www.pmda.go.jp>）並びに弊社ホームページの「医療関係者の皆様へ」のページ（<http://www.towayakuhin.co.jp/forstaff>）に掲載致します。



製造販売元
東和薬品株式会社
大阪府門真市新橋町2番11号

【製品情報お問い合わせ先】
学術部DIセンター
☎0120-108-932