

光線過敏性反応(光にあたった部分が赤くなる
など)があらわれることがありますので、
服用中は長袖の衣服、帽子などの着用により
日光の照射をさけ、日焼け止め効果の高い
サンスクリーンの使用により紫外線の照射を
さけてください。



施設名

東和薬品株式会社

ポリコナゾール錠「トロー」を 服用されている方へ

真菌感染症を治療する薬です。

この薬は食事の影響を受けるので、

食間(食事と食事の間)に服用してください。

この薬は体調がよくなったと自分で判断して服用を中止したり
量を加減したりすると病気が再発することがあります。

医師の指示通りに服用してください。





服用中に以下のような症状が出たら、
すぐに医師・薬剤師にお知らせください。

眼

- 風景がまぶしく見える (羞明)^{しゅうめい}
- ものが見えにくい (視覚異常)
- ものが霞んで見える (霧視)^{むし}
- 景色の色が変化する (色覚異常)

皮膚

- 光にあたった部分が赤くなる

全身にあらわれる症状

- 冷や汗、顔色が青白くなる、息苦しい
- 高熱、皮膚が赤くなる、口内炎ができる
- 体がだるい、食欲不振、皮膚や白目が黄色くなる
- 胸が痛い、動悸、脈が乱れる
- 呼吸困難、全身のむくみ

この他にも気になる症状が出た場合は、医師・薬剤師にご相談ください。

生活上の注意

- まぶしく見える (羞明)^{しゅうめい}
- ものが見えにくい (視覚異常)
- 霞んで見える (霧視)^{むし} などは、

服用中止後も症状が持続することがあります。

これらの症状が回復するまでは、

自動車の運転など、危険を伴う機械の操作は
行わないでください。

