

フィナステリド「トーワ」を服用されている方へ

●1日1回、内服してください。

6ヵ月服用しても抜け毛が減らない場合は、医師に相談してください。

●男性成人のみ服用してください。

女性には効果が認められていません。

妊娠中あるいは妊娠している可能性のある方及び授乳中の方は服用しないでください。

(妊娠中の方が服用すると男子胎児の生殖器官等の正常発育に影響を及ぼすおそれがあります。)



●分割・粉碎して服用しないでください。

分割・粉碎した本剤に妊娠中の女性が接触すると、有効成分が吸収され、男子胎児の生殖器官等の正常発育に影響を及ぼすおそれがあります。

錠剤を割って服用した場合の安全性・有効性は保証されておりません。なお、本剤はコーティングされていますので、割れたり碎けたりしない限り、通常の扱いにおいて有効成分に触れる事はありません。



●肝機能障害のある方は医師に相談してください。

この薬は肝臓で代謝される薬です。服用中に肝機能異常がみられた報告があります。肝機能障害のある方は、医師に相談してください。

●家族や他の人にあげないでください。

●小児の誤飲に注意してください。

小児の手の届かないところに保管してください。

誤飲の原因となりますので、他の容器に入れ替えないでください。



裏面もお読みください

この薬の副作用

まれに全身けん怠感などの肝機能障害の症状があらわれる可能性があります。このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

その他の注意

●前立腺がんの検診を受ける予定のある方は、検査を実施される医師にフィナステリド「トーワ」を服用していることをお知らせください。

この薬は、前立腺がん検査で測定されるPSA値を約50%低下させることが知られています。したがって、測定したPSA濃度を2倍した値を目安として評価してください。

●この薬を服用中、および服用後1ヵ月間は献血をご遠慮ください。

偽造医薬品にご注意ください。

偽造医薬品を服用した場合は思いがけない健康被害が発生する可能性があります。偽造医薬品を服用しないために、インターネットなどで安易に注文せず、医療機関を受診して、医師の処方により正しく服用してください。

厚生労働省：個人輸入に関する注意

「医薬品等を海外から輸入しようとされる方へ」

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/kojinryunu/index.html

個人輸入された医薬品による健康被害については公的制度（医薬品副作用被害救済制度）の救済対象となりません。



東和薬品株式会社

2016年8月作成 (C-1)