

プラミペキソール塩酸塩LA錠MI「トーワ」 を服用される方とご家族の方へ

この薬を正しく服用するため、飲む前に必ずお読みください。

- この薬を飲むと、眠くなったり、前兆もなく急に眠り込んでしまうこと（突発的睡眠）、まためまいや立ちくらみ、ふらつきが起こることがあります。



自動車の運転、危険を伴う機械の操作、高い所での作業などは避けてください。

突発的睡眠について

食事中や会話の最中などに急に眠り込んでしまうことがあります。また、このような症状は、薬を飲み始めて1年以上経過してから見られる場合もあります。

- **衝動制御障害や、以下のようなことが起こったら、すぐに医師または薬剤師に連絡してください。**

- 急激な眠り込み
- 幻覚や妄想
- めまいや立ちくらみ
- 発熱や意識がぼんやりした状態
- 筋肉のこわばりがひどい状態

衝動制御障害（病的賭博、強迫性購買、病的性欲亢進、暴食等）

社会的に不利な結果を招くにもかかわらず、ギャンブルや過剰で無計画な買い物を持続的に繰り返したり、病的に性欲や食欲が亢進したりすること。

裏面もお読みください

- 薬は飲む直前にシートから取り出してください。
- 割ったり、碎いたりしないで、そのまま嚥まずに飲んでください。
- 飲み方は、必ず医師の指示に従ってください。
自分の判断で飲む量を減らしたり、飲むのを止めないでください。
- 光の当たらない涼しいところに、湿気を避けて保管してください。
- この他にも、気になることやわからないことがある場合は、
医師または薬剤師に相談してください。

施設名



東和薬品株式会社

2016年8月作成 (C-1)