

タクロリムス「トローワ」を 服用される関節リウマチの方へ

この薬は、免疫を抑えて、関節リウマチの関節の腫れ・痛み・こわばりなどの症状を改善する薬です。

この薬を服用する前に、下記の内容を確認し、
該当される方は医師または薬剤師に
相談してください。

- 熱・咳・息苦しさがある
- 以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある
- 妊娠または妊娠している可能性がある
- 授乳中である
- ほかの薬（市販の薬を含む）や健康食品、サプリメントなどを服用している
- 予防接種を受ける予定がある
- 肝臓が悪い
- 腎臓が悪い

裏面には薬を服用する際の
注意点が記載されていますので、
必ず確認してください。



東和薬品株式会社



薬を服用する際には下記の点にご注意ください

- PTPシートから薬を取り出して、服用してください。
- 必ず指示された量を、1日1回、夕食後に、コップ1杯の水またはぬるま湯と一緒に服用してください。
- 飲み忘れた場合は、翌日の夕食後に1日分を服用するようにしてください。
絶対に2回分を一度に飲んだり、服用時間を変更しないようにしてください。
- 誤って多く服用した場合は、すぐに医師または薬剤師に相談してください。
- ご自分の判断で薬の量や服用する時間、回数を変更したり、服用を中止したりしないでください。



服用期間中は下記の点にご注意ください

- 予防接種は医師の許可なしに受けなくて、必ず相談してください。
- グレープフルーツ(ジュースを含む)や一部のかんきつ類(ブンタン、ハッサクなど)は、この薬の作用を強くし、副作用があらわれやすくなることがありますので、一緒に摂取することは避けてください。
- セイヨウオトギリソウ(セント・ジョーンズワート)を含む健康食品・サプリメントは、この薬の作用を弱くすることがありますので、一緒に摂取することは避けてください。



気になることやわからないことがある場合や、
服用中に体調の変化などがありましたら、
医師または薬剤師に相談してください。