

使用上の注意改訂のお知らせ

2018年7月

東和薬品株式会社

広範囲経口抗菌剤

シプロフロキサシン錠100mg「トーフ」 シプロフロキサシン錠200mg「トーフ」

《シプロフロキサシン塩酸塩錠》

このたび、標記製品の「使用上の注意」を改訂致しましたのでお知らせ申し上げます。
なお、改訂添付文書を封入した製品がお手元に届くまでには日数を要する場合がございますので、
今後のご使用に際しましては、下記内容にご留意くださいますようお願い申し上げます。

1. 改訂内容

改訂後（下線部改訂）	改訂前												
<p>【禁忌（次の患者には投与しないこと）】</p> <p>4) <u>ロミタピドメシル酸塩を投与中の患者（「相互作用」の項参照）</u></p>	<p>【禁忌（次の患者には投与しないこと）】</p> <p>（該当する記載なし）</p>												
<p>2. 相互作用</p> <p>1) 併用禁忌（併用しないこと）</p> <table border="1"><thead><tr><th>薬剤名等</th><th>臨床症状・措置方法</th><th>機序・危険因子</th></tr></thead><tbody><tr><td><u>ロミタピドメシル酸塩</u> <u>ジャクスタ</u> <u>ピッド</u></td><td><u>ロミタピドの血中濃度が著しく上昇するおそれがある。</u></td><td><u>ロミタピドの代謝酵素（CYP3A4）が阻害されるおそれがある。</u></td></tr></tbody></table>	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	<u>ロミタピドメシル酸塩</u> <u>ジャクスタ</u> <u>ピッド</u>	<u>ロミタピドの血中濃度が著しく上昇するおそれがある。</u>	<u>ロミタピドの代謝酵素（CYP3A4）が阻害されるおそれがある。</u>	<p>2. 相互作用</p> <p>1) 併用禁忌（併用しないこと）</p> <table border="1"><thead><tr><th>薬剤名等</th><th>臨床症状・措置方法</th><th>機序・危険因子</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="3">（該当する記載なし）</td></tr></tbody></table>	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	（該当する記載なし）		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子											
<u>ロミタピドメシル酸塩</u> <u>ジャクスタ</u> <u>ピッド</u>	<u>ロミタピドの血中濃度が著しく上昇するおそれがある。</u>	<u>ロミタピドの代謝酵素（CYP3A4）が阻害されるおそれがある。</u>											
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子											
（該当する記載なし）													

該当項目のみ記載

2. 改訂理由

「禁忌」「相互作用 併用禁忌」の項（自主改訂）

相互作用相手薬剤と整合性をとるため、「禁忌」「相互作用 併用禁忌」の項を改訂し、注意喚起致しました。

今回の改訂内容につきましては、日本製薬団体連合会の医薬品安全対策情報（DSU）No. 271（2018年7月）に掲載される予定です。

また、改訂後の添付文書全文につきましては、独立行政法人 医薬品医療機器総合機構のホームページ（<http://www.pmda.go.jp/>）及び弊社「東和薬品医療関係者向けサイト」（<http://med.towayakuhin.co.jp/medical/product/>）に掲載致します。

製造販売元

東和薬品株式会社

大阪府門真市新橋町2番11号

【製品情報お問い合わせ先】

学術部DIセンター

☎0120-108-932