医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。

# 使用上の注意改訂のお知らせ

2025年1月-2月

**東和薬品株式会社**

合成副腎皮質ホルモン剤
日本薬局方 プレドニゾロン錠

## プレドニゾロン錠5mg「トーワ」

このたび、標記製品の使用上の注意を改訂いたしましたのでお知らせいたします。
今後のご使用に際しましては、改訂内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。

### 1. 改訂内容 （＿＿＿：追記、－－－－－：削除、～～～～～：移動）

**改訂後**

10. 相互作用
10.2 併用注意（併用に注意すること）

| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
|---|---|---|
| CYP3A4阻害剤<br>コビシスタット含有製剤、リトナビル含有製剤、エリスロマイシン等 | 本剤の血中濃度を上昇させる可能性があるので、併用する場合には用量に注意すること。 | CYP3A4阻害作用により、本剤の代謝が阻害される。 |

11. 副作用
11.2 その他の副作用

| 種類＼頻度 | 頻度不明 |
|---|---|
| 脂質・蛋白質代謝 | 満月様顔貌、野牛肩、窒素負平衡 |
| 肝臓 | 肝機能障害（AST上昇、ALT上昇、γ-GTP上昇、Al-P上昇）、脂肪肝 |

**改訂前**

10. 相互作用
10.2 併用注意（併用に注意すること）

| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
|---|---|---|
| エリスロマイシン | 本剤の作用が増強されるとの報告があるので、併用する場合には用量に注意すること。 | 本剤の代謝が抑制される。 |

11. 副作用
11.2 その他の副作用

| 種類＼頻度 | 頻度不明 |
|---|---|
| 脂質・蛋白質代謝 | 満月様顔貌、野牛肩、窒素負平衡、脂肪肝 |
| （該当する記載なし） | |

### 2. 改訂理由（自主改訂）

報告例の集積、海外添付文書及び海外文献情報をふまえて、改訂いたしました。

**今回の改訂内容につきましては、日本製薬団体連合会の医薬品安全対策情報（DSU）No.333（2025年2月）に掲載の予定です。**

最新の電子添文は、医薬品医療機器総合機構のホームページ(https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html)及び弊社「東和薬品医療関係者向けサイト」（https://med.towayakuhin.co.jp/medical/）に掲載いたします。
また、専用アプリ「添文ナビ」で右記GS1バーコードを読み取ることでも、最新の電子添文等をご参照いただけます。

(01)14987155062073

製造販売元
**東和薬品株式会社**
大阪府門真市新橋町2番11号

【製品情報お問い合わせ先】
学術部DIセンター
TEL 0120-108-932

○●医療関係者向けメール配信サービスのご案内●○
電子添文改訂等の適正使用情報に関するウェブサイト更新情報をメールにてお知らせいたします。
https://med.towayakuhin.co.jp/medical/useful/mail.php