

医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。

## 使用上の注意改訂のお知らせ

2025 年 8 月

東和薬品株式会社

高血圧・狭心症・不整脈・片頭痛治療剤  
日本薬局方 プロプラノロール塩酸塩錠

### プロプラノロール塩酸塩錠 10mg「トーフ」

このたび、標記製品の使用上の注意を改訂いたしましたのでお知らせいたします。  
今後のご使用に際しましては、改訂内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。

#### 1. 改訂内容（\_\_\_\_\_：削除）

| 改 訂 後                                                 |                                                         |                                                                                                                                                               | 改 訂 前                                                                                 |           |         |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 10. 相互作用<br>10.2 併用注意（併用に注意すること）                      |                                                         |                                                                                                                                                               | 10. 相互作用<br>10.2 併用注意（併用に注意すること）                                                      |           |         |
| 薬剤名等                                                  | 臨床症状・措置方法                                               | 機序・危険因子                                                                                                                                                       | 薬剤名等                                                                                  | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
| 交感神経系に対し抑制的に作用する他の薬剤<br>β遮断剤（チモロール等の点眼剤を含む）等          | 交感神経系の過剰の抑制（徐脈、心不全等）をきたすことがあるので、減量するなど慎重に投与すること。        | 相互に作用（交感神経抑制作用）を増強させる。                                                                                                                                        | 交感神経系に対し抑制的に作用する他の薬剤<br><del>レセルピン</del> 、β遮断剤（チモロール等の点眼剤を含む）等                        | （略）       | （略）     |
| 血糖降下剤<br>インスリン、アセトヘキサミド等                              | 血糖降下作用が増強されることがある。また、低血糖症状（頻脈等）をマスクすることがあるので血糖値に注意すること。 | 血糖値が低下するとカテコールアミンが副腎から分泌され、肝でのグリコーゲンの分解を促し、血糖値を上昇させる。このとき、肝臓のβ受容体が遮断されていると、カテコールアミンによる血糖上昇作用が抑えられ、血糖降下作用が増強する可能性がある。また、カテコールアミンによる頻脈のような低血糖症状がマスクされると考えられている。 | 血糖降下剤<br>インスリン、 <del>トルブタミド</del> 、アセトヘキサミド等                                          | （略）       | （略）     |
| クラスⅠ抗不整脈剤<br>ジソピラミド、プロカインアミド等<br>クラスⅢ抗不整脈剤<br>アミオダロン等 | 過度の心機能抑制（徐脈、心停止等）があらわれることがあるので、減量するなど慎重に投与すること。         | 抗不整脈剤は陰性変力作用及び陰性変時作用を有する。β遮断剤もカテコールアミンの作用を遮断することにより心機能を抑制するため、併用により心機能が過度に抑制される。                                                                              | クラスⅠ抗不整脈剤<br>ジソピラミド、 <del>プロカインアミド</del> 、 <del>アジマリン</del> 等<br>クラスⅢ抗不整脈剤<br>アミオダロン等 | （略）       | （略）     |

#### 2. 改訂理由（自主改訂）

販売中止品名を削除いたしました。

今回の改訂内容につきましては、日本製薬団体連合会の医薬品安全対策情報（DSU）No.339（2025年9月）に掲載の予定です。

最新の電子添文は、医薬品医療機器総合機構のホームページ(<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html>)  
及び弊社「東和薬品医療関係者向けサイト」 (<https://med.towayakuhin.co.jp/medical/>) に掲載いたします。

また、専用アプリ「添文ナビ」で右記GS1バーコードを読み取ることで、最新の電子添文等をご参照いただけます。



(01) 14987155172109

製造販売元

**東和薬品株式会社**

大阪府門真市新橋町2番11号

【製品情報お問い合わせ先】

学術部DIセンター

TEL 0120-108-932

○●医療関係者向けメール配信サービスのご案内●○

電子添文改訂等の適正使用情報に関するウェブサイト  
更新情報をメールにてお知らせいたします。

<https://med.towayakuhin.co.jp/medical/useful/mail.php>

