医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。

「効能又は効果」、「用法及び用量」追加のお知らせ

2024年11月

製造販売元　富士フイルム富山化学株式会社
発　　売　東和薬品株式会社

薬価基準未収載

代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤
ペメトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物

ペメトレキセド点滴静注液800mg「トーワ」

このたび、標記製品につきまして、2024年11月27日付で「効能又は効果」、「用法及び用量」の追加が承認されましたので、お知らせ申し上げます。
今後のご使用に際しましては、改訂内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。

1.「効能又は効果」、「用法及び用量」追加の概要

項目	概要
効能又は効果	「扁平上皮癌を除く非小細胞肺癌における術前補助療法」を追加
用法及び用量	「扁平上皮癌を除く非小細胞肺癌における術前補助療法」に対する用法及び用量を追加

2.「効能又は効果」、「用法及び用量」の改訂内容　（_____：削除）

改　訂　後	改　訂　前
4. 効能又は効果 〇悪性胸膜中皮腫 〇切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌 〇扁平上皮癌を除く非小細胞肺癌における術前補助療法	4. 効能又は効果 〈製剤共通〉 〇悪性胸膜中皮腫 〇切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌 〈点滴静注液100mg、点滴静注液500mg〉 〇扁平上皮癌を除く非小細胞肺癌における術前補助療法
6. 用法及び用量 〈悪性胸膜中皮腫〉 （略：現行通り） 〈切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌〉 （略：現行通り） 〈扁平上皮癌を除く非小細胞肺癌における術前補助療法〉 （略：現行通り）	6. 用法及び用量 〈悪性胸膜中皮腫〉 （略） 〈切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌〉 （略） 〈扁平上皮癌を除く非小細胞肺癌における術前補助療法〉 ニボルマブ（遺伝子組換え）及び白金系抗悪性腫瘍剤との併用において、通常、成人にはペメトレキセドとして、1日1回500mg/m^2（体表面積）を10分間かけて点滴静注し、少なくとも20日間休薬する。これを1コースとし、3コースまで投与を繰り返す。なお、患者の状態により適宜減量する。

※ 関連する使用上の注意は電子添文をご参照ください。

最新の電子添文は、医薬品医療機器総合機構のホームページ(https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html)及び弊社「東和薬品医療関係者向けサイト」（https://med.towayakuhin.co.jp/medical/）に掲載いたします。
また、専用アプリ「添文ナビ」で右記GS1バーコードを読み取ることでも、最新の電子添文等をご参照いただけます。

(01)14987155153030

発売
東和薬品株式会社
大阪府門真市新橋町２番11号

【製品情報お問い合わせ先】
学術部DIセンター
フリーコール 0120-108-932

〇●医療関係者向けメール配信サービスのご案内●〇
電子添文改訂等の適正使用情報に関するウェブサイト更新情報をメールにてお知らせいたします。
https://med.towayakuhin.co.jp/medical/useful/mail.php