

医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。

使用上の注意改訂のお知らせ

2026年3月

東和薬品株式会社

抗リウマチ剤

日本薬局方 メトトレキサートカプセル

メトトレキサートカプセル 2mg 「トーフ」

メトトレキサート錠 2mg 「トーフ」

このたび、標記製品の使用上の注意を改訂いたしましたのでお知らせいたします。
今後のご使用に際しましては、改訂内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。

1. 改訂内容 (_____ : 追記、 _____ : 削除)

改訂前	改訂後												
8. 重要な基本的注意 〈効能共通〉 (該当する記載なし)	8. 重要な基本的注意 〈効能共通〉 8.13 光線過敏症が報告されているので、適切な日焼け防止対策を行い、強い日光又は紫外線への曝露を避けるよう患者に指導すること。 [10.2参照]												
10. 相互作用 10.2 併用注意 (併用に注意すること)	10. 相互作用 10.2 併用注意 (併用に注意すること)												
<table border="1"><thead><tr><th>薬剤名等</th><th>臨床症状・措置方法</th><th>機序・危険因子</th></tr></thead><tbody><tr><td>ポルフィロマニナトリウム</td><td>光線過敏症を起こすことがある。</td><td>ポルフィロマニナトリウムは光感受性を高める作用があるため、光線過敏症を起こしやすい薬剤の作用を増強する。</td></tr></tbody></table>	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	ポルフィロマニナトリウム	光線過敏症を起こすことがある。	ポルフィロマニナトリウムは光感受性を高める作用があるため、光線過敏症を起こしやすい薬剤の作用を増強する。	<table border="1"><thead><tr><th>薬剤名等</th><th>臨床症状・措置方法</th><th>機序・危険因子</th></tr></thead><tbody><tr><td>タラポルフィンナトリウム [8.13参照]</td><td>光線過敏症を起こすことがある。</td><td>併用薬剤が光感受性を高めるため、光線過敏症を起こしやすい薬剤の作用を増強する。</td></tr></tbody></table>	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	タラポルフィンナトリウム [8.13参照]	光線過敏症を起こすことがある。	併用薬剤が光感受性を高めるため、光線過敏症を起こしやすい薬剤の作用を増強する。
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子											
ポルフィロマニナトリウム	光線過敏症を起こすことがある。	ポルフィロマニナトリウムは光感受性を高める作用があるため、光線過敏症を起こしやすい薬剤の作用を増強する。											
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子											
タラポルフィンナトリウム [8.13参照]	光線過敏症を起こすことがある。	併用薬剤が光感受性を高めるため、光線過敏症を起こしやすい薬剤の作用を増強する。											

2. 改訂理由 (自主改訂)

同一成分薬のCCDS (企業中核データシート) が変更されたため、改訂いたしました。

今回の改訂内容につきましては、日本製薬団体連合会の医薬品安全対策情報 (DSU) No.344 (2026年4月) に掲載の予定です。

最新の電子添文は、医薬品医療機器総合機構のホームページ(<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html>)

及び弊社「東和薬品医療関係者向けサイト」 (<https://med.towayakuhin.co.jp/medical/>) に掲載いたします。

また、専用アプリ「添文ナビ」で右記GS1バーコードを読み取ることで、最新の電子添文等をご参照いただけます。



(01)14987155875017

製造販売元

東和薬品株式会社

大阪府門真市新橋町2番11号

【製品情報お問い合わせ先】

学術部DIセンター

TEL 0120-108-932

○●医療関係者向けメール配信サービスのご案内●○

電子添文改訂等の適正使用情報に関するウェブサイト
更新情報をメールにてお知らせいたします。

<https://med.towayakuhin.co.jp/medical/useful/mail.php>

