医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。

「効能又は効果」、「用法及び用量」追加のお知らせ

2024年11月

東和薬品株式会社

薬価基準未収載

抗造血器悪性腫瘍剤
レナリドミドカプセル

レナリドミドカプセル2.5mg「トーワ」

このたび、標記製品につきまして、2024年11月13日付で「効能又は効果」、「用法及び用量」の追加が承認されましたので、お知らせ申し上げます。
今後のご使用に際しましては、改訂内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。

「効能又は効果」、「用法及び用量」の追加内容　（＿＿＿：追記）

改　訂　後	改　訂　前
4. 効能又は効果 ○多発性骨髄腫 ○5番染色体長腕部欠失を伴う骨髄異形成症候群	4. 効能又は効果 ○多発性骨髄腫
6. 用法及び用量 〈5番染色体長腕部欠失を伴う骨髄異形成症候群〉 通常、成人にはレナリドミドとして1日1回10mgを21日間連日経口投与した後、7日間休薬する。これを1サイクルとして投与を繰り返す。なお、患者の状態により適宜減量する。	6. 用法及び用量 （該当する記載なし）

※ 関連する使用上の注意は電子添文をご参照ください。

最新の電子添文は、医薬品医療機器総合機構のホームページ(https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html)及び弊社「東和薬品医療関係者向けサイト」（https://med.towayakuhin.co.jp/medical/）に掲載いたします。
また、専用アプリ「添文ナビ」で右記GS1バーコードを読み取ることでも、最新の電子添文等をご参照いただけます。

(01)14987155162193

製造販売元
東和薬品株式会社
大阪府門真市新橋町2番11号

【製品情報お問い合わせ先】
学術部DIセンター
TEL 0120-108-932

○●医療関係者向けメール配信サービスのご案内●○
電子添文改訂等の適正使用情報に関するウェブサイト更新情報をメールにてお知らせいたします。
https://med.towayakuhin.co.jp/medical/useful/mail.php