

医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。

使用上の注意改訂のお知らせ

2026年3月

東和薬品株式会社

HMG-CoA 還元酵素阻害剤

日本薬局方 ロスバスタチンカルシウム錠

ロスバスタチン錠 2.5mg/5mg/10mg 「トーフ」

ロスバスタチン OD 錠 2.5mg/5mg/10mg 「トーフ」

このたび、標記製品の使用上の注意を改訂いたしましたのでお知らせいたします。
今後のご使用に際しましては、改訂内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。

1. 改訂内容 (____: 追記)

改訂前			改訂後		
10. 相互作用 10.2 併用注意 (併用に注意すること)			10. 相互作用 10.2 併用注意 (併用に注意すること)		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
(該当する記載なし)			ベルモスジル	本剤とベルモスジルを併用したとき、本剤のAUC _{0-1last} が4.62倍、C _{max} が3.59倍上昇したとの報告がある。 ³⁾	ベルモスジルのBCRP及びOATP1B1阻害作用により、本剤の血中濃度が上昇する可能性がある。
			モメロチニブ	本剤とモメロチニブを併用したとき、本剤のAUC _{inf} が2.7倍、C _{max} が3.2倍上昇したとの報告がある。 ⁴⁾	モメロチニブのBCRP阻害作用により、本剤の血中濃度が上昇する可能性がある。
23. 主要文献 (該当する記載なし)			23. 主要文献 3) Schueller O, et al. : J Clin Pharmacol. 2025 ; 65(8) : 1026-1038 4) Ho Y, et al. : Clin Transl Sci. 2024 ; 17(4) : e13799		

2. 改訂理由 (自主改訂)

相互作用相手薬の記載との整合性を図るため、改訂いたしました。

<記載整備>

「血管浮腫」 → 「血管性浮腫」

今回の改訂内容につきましては、日本製薬団体連合会の医薬品安全対策情報 (DSU) No.344 (2026年4月) に掲載の予定です。

最新の電子添文は、医薬品医療機器総合機構のホームページ(<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html>)

及び弊社「東和薬品医療関係者向けサイト」 (<https://med.towayakuhin.co.jp/medical/>) に掲載いたします。

また、専用アプリ「添文ナビ」で右記GS1バーコードを読み取ることで、最新の電子添文等をご参照いただけます。



(01)14987155131052

製造販売元

東和薬品株式会社

大阪府門真市新橋町2番11号

【製品情報お問い合わせ先】

学術部DIセンター

TEL 0120-108-932

○●医療関係者向けメール配信サービスのご案内●○

電子添文改訂等の適正使用情報に関するウェブサイト

更新情報をメールにてお知らせいたします。

<https://med.towayakuhin.co.jp/medical/useful/mail.php>

