

# 体重別小児投与量早見表

## アセトアミノフェン細粒20%「トローワ」

体重 (kg)	有効成分として	細粒として
	1回量(mg) (10~15mg/kg)	1回量(g)
4	40~60	0.20~0.30
6	60~90	0.30~0.45
8	80~120	0.40~0.60
10	100~150	0.50~0.75
12	120~180	0.60~0.90
14	140~210	0.70~1.05
16	160~240	0.80~1.20
18	180~270	0.90~1.35
20	200~300	1.00~1.50
22	220~330	1.10~1.65
24	240~360	1.20~1.80
26	260~390	1.30~1.95
28	280~420	1.40~2.10
30	300~450	1.50~2.25
32	320~480	1.60~2.40
34	340~500*	1.70~2.50*
36	360~500*	1.80~2.50*
38	380~500*	1.90~2.50*
40	400~500*	2.00~2.50*

\* : 1回あたりの最大用量はアセトアミノフェンとして 500mg

### 【用法・用量】(一部抜粋)

効能・効果 3) の場合

通常、乳児、幼児及び小児にはアセトアミノフェンとして、体重 1kg あたり 1 回 10~15mg を経口投与し、投与間隔は 4~6 時間以上とする。なお、年齢、症状により適宜増減するが、1 日総量として 60mg/kg を限度とする。ただし、成人の用量を超えない。また、空腹時の投与は避けさせることが望ましい。

#### 【用法・用量に関連する使用上の注意】

1) 乳児、幼児及び小児の 1 回投与量の目安は下記のとおり。

体重	1回用量	
	アセトアミノフェン	細粒20%
5kg	50-75mg	0.25-0.375g
10kg	100-150mg	0.5-0.75g
20kg	200-300mg	1.0-1.5g
30kg	300-450mg	1.5-2.25g

2) 「小児科領域における解熱・鎮痛」の効能・効果に対する 1 回あたりの最大用量はアセトアミノフェンとして 500mg、1 日あたりの最大用量はアセトアミノフェンとして 1500mg である。

#### 【使用上の注意】慎重投与

12) 小児等

#### 【使用上の注意】重要な基本的注意

4) 高齢者及び小児等には副作用の発現に特に注意し、必要最小限の使用にとどめるなど慎重に投与すること。

#### 【使用上の注意】小児等への投与

低出生体重児、新生児及び 3 ヶ月未満の乳児に対する使用経験が少なく、安全性は確立していない。

●その他の詳細につきましては製品電子添文をご参照ください●

<https://med.towayakuhin.co.jp/medical/product/product.php?id=T001606201603140953004t>



東和薬品

2023 年 6 月改訂(第 2 版)