


リスペリドン内用液1mg/mL「トーフ」 ご使用の方へ

この薬は、「のみ薬(内用液)」です。

- ☆ **【押さえる】マーク**を持って、開封口から開けてください。
- ☆ その他の部分を持って開封すると、中身が飛び出る恐れがあります。



ご使用にあたって

- ① 直接飲む場合
ゆっくりと袋をしぼりながら、開封口から直接お飲みください。
- ② 薄めて飲む場合
コップ1杯くらいの水やジュースなどに混ぜて飲むこともできます。
水やジュースに混ぜた後は、なるべく早く飲んでください。
なお、茶葉抽出飲料(日本茶・紅茶・烏龍茶など)およびコーラには混ぜないようにしてください。
- ③ 目、耳、鼻に使用しないでください。




東和薬品株式会社

(うら面もお読みください)

リスペリドン内用液1mg/mL「トーフ」 ご使用の方へ

この薬は、「のみ薬(内用液)」です。

- ☆ **【押さえる】マーク**を持って、開封口から開けてください。
- ☆ その他の部分を持って開封すると、中身が飛び出る恐れがあります。



ご使用にあたって

- ① 直接飲む場合
ゆっくりと袋をしぼりながら、開封口から直接お飲みください。
- ② 薄めて飲む場合
コップ1杯くらいの水やジュースなどに混ぜて飲むこともできます。
水やジュースに混ぜた後は、なるべく早く飲んでください。
なお、茶葉抽出飲料(日本茶・紅茶・烏龍茶など)およびコーラには混ぜないようにしてください。
- ③ 目、耳、鼻に使用しないでください。




東和薬品株式会社

(うら面もお読みください)

リスペリドン内用液1mg/mL「トーフ」 ご使用の方へ

この薬は、「のみ薬(内用液)」です。

- ☆ **【押さえる】マーク**を持って、開封口から開けてください。
- ☆ その他の部分を持って開封すると、中身が飛び出る恐れがあります。



ご使用にあたって

- ① 直接飲む場合
ゆっくりと袋をしぼりながら、開封口から直接お飲みください。
- ② 薄めて飲む場合
コップ1杯くらいの水やジュースなどに混ぜて飲むこともできます。
水やジュースに混ぜた後は、なるべく早く飲んでください。
なお、茶葉抽出飲料(日本茶・紅茶・烏龍茶など)およびコーラには混ぜないようにしてください。
- ③ 目、耳、鼻に使用しないでください。




東和薬品株式会社

(うら面もお読みください)

リスペリドン内用液1mg/mL「トーフ」 ご使用の方へ

この薬は、「のみ薬(内用液)」です。

- ☆ **【押さえる】マーク**を持って、開封口から開けてください。
- ☆ その他の部分を持って開封すると、中身が飛び出る恐れがあります。



ご使用にあたって

- ① 直接飲む場合
ゆっくりと袋をしぼりながら、開封口から直接お飲みください。
- ② 薄めて飲む場合
コップ1杯くらいの水やジュースなどに混ぜて飲むこともできます。
水やジュースに混ぜた後は、なるべく早く飲んでください。
なお、茶葉抽出飲料(日本茶・紅茶・烏龍茶など)およびコーラには混ぜないようにしてください。
- ③ 目、耳、鼻に使用しないでください。



東和薬品株式会社

(うら面もお読みください)

この薬を飲んでいる間は

- この薬を飲むと、**眠気、注意力・集中力・反射運動能力などの低下**が起こることがありますので、**自動車の運転など危険を伴う機械の操作**は行わないでください。また、症状が強いときは、すぐに医師または薬剤師にご相談ください。
- 飲酒により薬の作用が強くあらわれることがあります**ので、服用中の飲酒は控えてください。
- 白内障の手術**を受ける際には、この薬を飲んでいる、または飲んでいたことを、眼科の先生にお伝えください。

保管上の注意

- ① 開封後は、すみやかに全量を飲んでください。
- ② お子様の手の届かないところに保管してください。
- ③ 冷蔵庫での保管は避けてください。（冷蔵庫などの冷所に保管すると、凍結する可能性があります。）

施設名

2017年7月改訂(C-3)

この薬を飲んでいる間は

- この薬を飲むと、**眠気、注意力・集中力・反射運動能力などの低下**が起こることがありますので、**自動車の運転など危険を伴う機械の操作**は行わないでください。また、症状が強いときは、すぐに医師または薬剤師にご相談ください。
- 飲酒により薬の作用が強くあらわれることがあります**ので、服用中の飲酒は控えてください。
- 白内障の手術**を受ける際には、この薬を飲んでいる、または飲んでいたことを、眼科の先生にお伝えください。

保管上の注意

- ① 開封後は、すみやかに全量を飲んでください。
- ② お子様の手の届かないところに保管してください。
- ③ 冷蔵庫での保管は避けてください。（冷蔵庫などの冷所に保管すると、凍結する可能性があります。）

施設名

2017年7月改訂(C-3)

この薬を飲んでいる間は

- この薬を飲むと、**眠気、注意力・集中力・反射運動能力などの低下**が起こることがありますので、**自動車の運転など危険を伴う機械の操作**は行わないでください。また、症状が強いときは、すぐに医師または薬剤師にご相談ください。
- 飲酒により薬の作用が強くあらわれることがあります**ので、服用中の飲酒は控えてください。
- 白内障の手術**を受ける際には、この薬を飲んでいる、または飲んでいたことを、眼科の先生にお伝えください。

保管上の注意

- ① 開封後は、すみやかに全量を飲んでください。
- ② お子様の手の届かないところに保管してください。
- ③ 冷蔵庫での保管は避けてください。（冷蔵庫などの冷所に保管すると、凍結する可能性があります。）

施設名

2017年7月改訂(C-3)

この薬を飲んでいる間は

- この薬を飲むと、**眠気、注意力・集中力・反射運動能力などの低下**が起こることがありますので、**自動車の運転など危険を伴う機械の操作**は行わないでください。また、症状が強いときは、すぐに医師または薬剤師にご相談ください。
- 飲酒により薬の作用が強くあらわれることがあります**ので、服用中の飲酒は控えてください。
- 白内障の手術**を受ける際には、この薬を飲んでいる、または飲んでいたことを、眼科の先生にお伝えください。

保管上の注意

- ① 開封後は、すみやかに全量を飲んでください。
- ② お子様の手の届かないところに保管してください。
- ③ 冷蔵庫での保管は避けてください。（冷蔵庫などの冷所に保管すると、凍結する可能性があります。）

施設名

2017年7月改訂(C-3)