

使用上の注意改訂のお知らせ

2014 年 11 月

東和薬品株式会社

消化性潰瘍・胃炎治療剤

マーレージ[®]懸濁用配合DS

このたび、標記製品の「使用上の注意」を改訂致しましたのでお知らせ申し上げます。
なお、改訂添付文書を封入した製品がお手元に届くまでには日数を要する場合がございますので、
今後のご使用に際しましては、下記内容にご留意くださいますようお願い申し上げます。

1. 改訂内容

改訂後（下線部改訂）			改訂前		
2. 相互作用 併用注意(併用に注意すること)			2. 相互作用 併用注意(併用に注意すること)		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
ドルテグラビ ルナトリウム	ドルテグラビルの血 漿中濃度をC _{max} で 72%、C ₂₄ で74%低下 させる。ドルテグラ ビルナトリウムは本 剤投与2時間前又は6 時間後の投与が推奨 される。	機序を形成する ことにより、ド ルテグラビルの 吸収が阻害され る。			(記載なし)

2. 改訂理由

「相互作用 併用注意」の項（自主改訂）

相手薬剤と整合性をとるため、「相互作用 併用注意」の項に追記致しました。

今回の改訂内容につきましては、日本製薬団体連合会の医薬品安全対策情報（DSU）No. 235
（2014 年 12 月）に掲載される予定です。

また、改訂後の添付文書全文につきましては、独立行政法人 医薬品医療機器総合機構「医薬
品医療機器情報提供ホームページ」（<http://www.info.pmda.go.jp>）並びに弊社ホームページの
「医療関係者の皆様へ」のページ（<http://www.towayakuhin.co.jp/forstaff>）に掲載致します。



製造販売元
東和薬品株式会社
大阪府門真市新橋町2番11号

【製品情報お問い合わせ先】
学術部DIセンター
☎0120-108-932