

医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。

「用法・用量」追加に伴う 添付文書改訂のお知らせ

2013年9月
東和薬品株式会社

持続性Ca拮抗剤－高血圧・狭心症治療剤－
ニフェジピンCR錠10mg「トーワ」
ニフェジピンCR錠20mg「トーワ」
ニフェジピンCR錠40mg「トーワ」
《ニフェジピン徐放錠》

このたび、平成25年6月に承認事項一部変更承認申請をしておりました弊社上記製品の「用法・用量」追加が平成25年9月26日付にて、下記の内容で承認されましたので、お知らせ申し上げます。

【改訂内容】

改訂後（下線部改訂）	改訂前
<p>【用法・用量】</p> <ul style="list-style-type: none">・高血圧症： 通常、成人にはニフェジピンとして20～40mgを1日1回経口投与する。ただし、1日10～20mgより投与を開始し、必要に応じ漸次増量する。<u>なお、1日40mgで効果不十分な場合には、1回40mg1日2回まで増量できる。</u>・腎実質性高血圧症、腎血管性高血圧症： （省略：現行のとおり）・狭心症、異型狭心症： （省略：現行のとおり）	<p>【用法・用量】</p> <ul style="list-style-type: none">・高血圧症、腎実質性高血圧症、腎血管性高血圧症 通常、成人にはニフェジピンとして20～40mgを1日1回経口投与する。ただし、1日10～20mgより投与を開始し、必要に応じ漸次増量する。・狭心症、異型狭心症 （省略）