

医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。

使用上の注意改訂のお知らせ

平成16年8月

ドナシン[®]錠1mg
ドナシン[®]錠2mg

《メシル酸ドキサゾシン錠》

東和薬品株式会社

この度、標記製品の「使用上の注意」を改訂いたしますのでご案内申し上げます。
今後のご使用に際しまして下記内容にご留意下さいますようお願い申し上げます。

1. 使用上の注意改訂内容 (裏面に改訂後の「使用上の注意」を記載しておりますので、併せてご参照下さい。)

改訂箇所	改訂内容 (下線部改訂箇所)
「禁忌」 追記	<u>塩酸バルデナフィル水和物を投与中の患者</u> (「相互作用」の項参照)
「併用禁忌」 新設	<u>塩酸バルデナフィル水和物〔臨床症状・措置方法：α遮断剤との併用で血圧低下あるいは起立性低血圧があらわれるとの報告がある。機序・危険因子：塩酸バルデナフィル水和物は血管拡張作用による降圧作用を有するため、本剤の降圧作用を増強するおそれがある。〕</u>

2. 改訂理由

「使用上の注意」の項を自主改訂致しました。(_____：点線部)

3. 解説理由

勃起不全治療剤レビトラ[®]錠 (塩酸バルデナフィル水和物) との整合を図る為、「禁忌」の項に「塩酸バルデナフィル水和物を投与中の患者」を追記し、「相互作用(併用禁忌)」の項を新たに設け記載し、注意喚起致しました。

■使用上の注意（下線部改訂箇所）（改訂項目のみ記載）

【禁忌（次の患者には投与しないこと）】

- 1) 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
- 2) 塩酸バルデナフィル水和物を投与中の患者（「相互作用」の項参照）

1. 慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）

現行のとおり

2. 重要な基本的注意

現行のとおり

3. 相互作用

1) 併用禁忌（併用しないこと）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
塩酸バルデナフィル水和物	<u>α遮断剤との併用で血圧低下あるいは起立性低血圧が現れるとの報告がある。</u>	<u>塩酸バルデナフィル水和物は血管拡張作用による降圧作用を有するため、本剤の降圧作用を増強するおそれがある。</u>

2) 併用注意（併用に注意すること）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
利尿剤又は他の降圧剤	相互に作用を増強するおそれがあるので、減量するなど注意すること。	相互に作用を増強するおそれがある。
クエン酸シルデナフィル	本剤との併用で服用後4時間以内にめまい等の自覚症状を伴う血圧低下を来したとの報告がある。	クエン酸シルデナフィルは血管拡張作用による降圧作用を有するため、本剤の降圧作用を増強するおそれがある。

4. 副作用

現行のとおり

5. 高齢者への投与

現行のとおり

6. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

現行のとおり

7. 小児等への投与

現行のとおり

8. 過量投与

現行のとおり

9. 適用上の注意

現行のとおり