アレルギー性疾患治療剤

エルピナン®DS小児用1%

〈携帯電話用〉お薬の情報ホームページ

http://www.towayakuhin.co.jp/m/elp-ds/



（75%縮小）

分包に『QRコード』を表示しています。


QRコードを携帯電話で読み取ると、
“http://www.towayakuhin.co.jp/m/elp-ds/”
のURLを簡単に取得できます。
アクセスすると、患者様向け携帯電話用お薬の
情報ホームページを閲覧できます。



〈イメージ図〉

アクセス！

閲覧確認ページ



サイトトップへ

■裏面もご覧ください。

※QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

サイトトップ

エルピナン®DS小児用1%

主治医または薬剤師の指示により、服用してください。



エルピナンＤＳ小児用１％は、お子さま用アレルギー性疾患のお薬です。

- このお薬の味は…
- お水で飲ませるときは…
- お水で飲みにくいときは…

監修：獨協医科大学 小児科学
准教授 吉原重美

- お問い合わせ
- 個人情報保護方針
- 利用規約

東和薬品
(C) TOWA PHARMACEUTICAL CO., LTD.

お薬の情報

※「エルピナンＤＳ小児用 1%の上手な飲ませ方」と同じ情報を記載しています。

エルピナン®DS小児用1%

このお薬の味は…

・甘みをつけた「いちごヨーグルト風味」です。
・このお薬の粒には苦みを防ぐコーティングがされていますので、つぶさないでください。



- お水で飲ませるときは…

⇒ サイトトップへ

- お問い合わせ
- 個人情報保護方針
- 利用規約

東和薬品
(C) TOWA PHARMACEUTICAL CO., LTD.

エルピナン®DS小児用1%

お水で飲ませるときは…

・少量のお水（10～20cc）に１回分のお薬を加え、軽くかき混ぜてから飲ませてください。
・このお薬は、お水に溶けませんが混ざります。



※混ぜたら時間をおかず、飲ませてください。

●飲ませた後のポイント

・このお薬は甘く味つけされていますが、口の中に残ったお薬が苦くなることがあります。お薬を飲ませた後は、すぐにお水を飲ませてあげるとよいでしょう。
・ジュースやアイスクリームなどを口に含ませるのも苦みを防ぐ良い方法です。

- お水で飲みにくいときは…

⇒ サイトトップへ

- お問い合わせ
- 個人情報保護方針
- 利用規約

東和薬品
(C) TOWA PHARMACEUTICAL CO., LTD.

エルピナン®DS小児用1%

お水で飲みにくいときは…

・お水のかわりに次のような飲みものや食べものと混ぜると、飲みやすくなります。（薬局にてボランティア10名の協力による。）



バニラアイスクリーム
牛　乳
ヨーグルト（加糖）



チョコレートシロップ
ミルクココア
オレンジジュース

・小さじ２～３杯程度（10～20cc）に１回分のお薬を加え、軽くかき混ぜてから飲ませてください。

※混ぜたら時間をおかず、飲ませてください。

スポーツ飲料、ゼリー、お茶と一緒に飲むと、苦みを感じやすくなることがあります。

●飲ませた後のポイント

・飲みやすくするもので飲ませたとしても、口の中に残ったお薬が苦くなることがあります。お薬を飲ませた後は、すぐにお水を飲ませてあげるとよいでしょう。

⇒ サイトトップへ

- お問い合わせ
- 個人情報保護方針
- 利用規約

東和薬品
(C) TOWA PHARMACEUTICAL CO., LTD.

お問い合わせ

エルピナン®DS小児用1%

お問い合わせ

・お子さまの健康に関連するご質問（疾患の治療方針、副作用など）については、主治医または薬剤師にご相談ください。
・このお薬に関するご質問は下記までお問い合わせください。

製造販売会社
東和薬品株式会社

くすり相談
電話番号：0120-757-108
受付時間
9：00～17：30
（土・日・祝日、その他弊社の休業日を除く）

東和薬品PC用ホームページ
http://www.towayakuhin.co.jp/

⇒ サイトトップへ

- お問い合わせ
- 個人情報保護方針
- 利用規約

東和薬品
(C) TOWA PHARMACEUTICAL CO., LTD.

個人情報保護方針、利用規約については、東和薬品株式会社が定める内容を記載しています。