経口用セフェム系抗生物質製剤

セフジトレンピボキシル細粒小児用10%「トーワ」

〈携帯電話用〉お薬の情報ホームページ

http://www.towayakuhin.co.jp/m/cefd-fg/



（実物大）

分包に『ＱＲコード』を表示しています。

ＱＲコードを携帯電話で読み取ると、
“http://www.towayakuhin.co.jp/m/cefd-fg/” のＵＲＬを簡単に取得できます。
アクセスすると、患者様向け携帯電話用お薬の情報ホームページを閲覧できます。



〈イメージ図〉

アクセス

閲覧確認ページ

セフジトレンピボキシル細粒小児用10%「トーワ」

セフジトレンピボキシル細粒小児用10%「トーワ」を服用されている（これから服用される）患者さん、またはご家族ですか？

● はい

● いいえ

【ご注意】
通信料はご利用者負担となります。

東和薬品

(C) TOWA PHARMACEUTICAL CO., LTD.

サイトトップへ

詳細内容については
裏面をご覧ください

セフジトレンピボキシル細粒小児用10%「トーワ」

申し訳ございません。

こちらに掲載している情報は、セフジトレンピボキシル細粒小児用10%「トーワ」を服用されている（これから服用される）患者さん、またはご家族を対象に作成したものです。

セフジトレンピボキシル細粒小児用10%「トーワ」を適正に服用していただくことを目的としておりますので、ご利用は対象の方に限定させていただいております。

※ＱＲコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

東和薬品株式会社

2011 年 5 月作成

サイトトップ

セフジトレンピボキシル細粒小児用10%「トーワ」

このお薬は、主治医または薬剤師の指示により服用してください。



セフジトレンピボキシル細粒小児用10%「トーワ」は、抗生物質製剤です。
掲載している情報は、お子様向けの説明内容となっておりますが、このお薬は、錠剤の服用が困難な成人の方にも処方されます。

⇒ 次のページへ（服用前の注意）

●コンテンツメニュー

服用前の注意 ▼

決　定

より詳細な情報を望まれる場合は、主治医または薬剤師におたずねください。

● お問い合わせ
● 個人情報保護方針
● 利用規約

東和薬品

(C) TOWA PHARMACEUTICAL CO., LTD.

●コンテンツメニュー

▼

服用前の注意
このお薬の味は
そのままお水で飲ませる
お水に混ぜて飲ませる
お水で飲ませにくい時は
服用を忘れた時は・服用時の注意
保管について
⇒サイトトップへ

お薬の情報

服用前の注意

次のような方は、服用前に必ず主治医と薬剤師に伝えてください。

・以前に薬を服用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。
・腎障害がある。
・妊娠中または授乳中である。
・妊娠の可能性がある。
・他に薬を服用している（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、大衆薬も含めて他に服用中の医薬品に注意してください）。

⇒ 次のページへ（このお薬の味は）

●コンテンツメニュー


このお薬の味は ▼

決　定

⇒ サイトトップへ

このお薬の味は

甘みをつけた「オレンジ風味」です。



⇒ 次のページへ（そのままお水で飲ませる）

●コンテンツメニュー

そのままお水で飲ませる ▼

決　定

⇒ サイトトップへ

そのままお水で飲ませる

このお薬は基本的には、粉のまま少量のお水で飲ませるお薬です。



そのまま飲むことを嫌がるお子様のために、次のページから上手な飲ませ方をご紹介します。

⇒ 次のページへ（お水に混ぜて飲ませる）

●コンテンツメニュー

お水に混ぜて飲ませる ▼

決　定

⇒ サイトトップへ

お水に混ぜて飲ませる

・少量のお水（20cc程度）と1回分のお薬を、軽くかき混ぜてから飲ませてください。
このお水の量は目安です。お好みに合わせて調節してください。
・このお薬は、お水に溶けませんが混ざります。



●飲ませた後のポイント

・口の中に残ったお薬が苦くなることがあります。
お薬を飲ませた後は、すぐにお水を飲ませてあげるとよいでしょう。
・ココアやアイスクリームなどを口に含ませるのも苦みを防ぐ良い方法です。

お薬を混ぜた場合

・飲ませる直前に1回分を混ぜてください。
・混ぜたお薬は保管しないでください。

⇒ 次のページへ（お水で飲ませにくい時は）

●コンテンツメニュー


お水で飲ませにくい時は ▼

決　定

⇒ サイトトップへ

お水で飲ませにくい時は

・お水のかわりに次のような飲みものや食べものと混ぜると、飲みやすくなります。（薬局にてボランティア12名の協力による。）



ミルクココア（冷）
バニラアイスクリーム
ヨーグルト（加糖）
プリン

・小さじ2～3杯程度（10cc程度）に1回分のお薬を加え、軽くかき混ぜてから飲ませてください。
この食品の量は目安です。お好みに合わせて調節してください。

●飲ませた後のポイント

・飲みやすくする食品で飲ませたとしても、口の中に残ったお薬が苦くなることがあります。お薬を飲ませた後は、すぐにお水を飲ませてあげるとよいでしょう。

飲みにくくするもの

次のような飲みものと一緒に飲むと、苦くなります。
お薬の服用前後に飲んでも、苦くなることがあります。



スポーツドリンク
お茶
酸味のあるジュース

お薬を混ぜた場合

・飲ませる直前に1回分を混ぜてください。
・混ぜたお薬は保管しないでください。

⇒ 次のページへ（服用時の注意・服用を忘れた時は）

●コンテンツメニュー

服用を忘れた時は・服用時の ▼

決　定

⇒ サイトトップへ

服用を忘れた時は

・気がついた時点ですぐに1回分を服用してください。ただし、次に服用する時間が近い場合は、忘れた1回分をとばして、次回から指示された時間に服用してください。
絶対に2回分を一度に服用してはいけません。

服用時の注意

・誤って多く服用した場合は主治医または薬剤師に相談してください。
・主治医の指示なしに、自分の判断で服用を止めないでください。

⇒ 次のページへ（保管について）

●コンテンツメニュー

保管について ▼

決　定

⇒ サイトトップへ

保管について

・乳幼児、小児の手の届かないところに保管してください。



・光や湿気を避けて、室温で保管してください。
・薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。廃棄については受け取った薬局に相談してください。

●コンテンツメニュー

⇒サイトトップへ ▼

決　定

⇒ サイトトップへ

個人情報保護方針、利用規約については、東和薬品株式会社が定める内容を記載しています。