

持続性選択 H<sub>1</sub> 受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤

# ロラタジンDS1%「トーフ」

## 〈携帯電話用〉お薬の情報ホームページ



<http://twyh.jp/lor-ds/>

分包と患者用指導せんに『QRコード』を表示しています。

QRコードを携帯電話で読み取ると、“<http://twyh.jp/lor-ds/>”のURLを取得できます。アクセスすると、患者様向け携帯電話用お薬の情報ホームページを閲覧できます。



〈イメージ図〉

### ロラタジンDS1%「トーフ」の 上手な飲み方

監修：獨協医科大学 小児科学 准教授 吉原重美 先生

●ロラタジンDS1%「トーフ」は甘みをつけたお薬です●

#### お水で飲ませるときは…

- ・小さじ1杯程度(5cc程度)のお水に1回分のお薬を加え、軽くかき混ぜてから飲ませてください。  
このお水の量は目安です。お好みに合わせて調節してください。
- ・このお薬は、お水に溶けませんが混ざります。
- ・お薬を飲ませたあとは、さらにお水を飲ませてあげると、口の中がすっきりします。



#### お薬を混ぜた場合

- ・飲ませる直前に1回分を混ぜてください。
- ・作り置きしないでください。

裏面もお読みください

施設名

携帯電話用  
お薬の情報



<http://twyh.jp/lor-ds/>

東和薬品株式会社

### 閲覧確認ページ

#### ロラタジンDS1%「トーフ」

ロラタジンDS1%「トーフ」を服用されている(これから服用される)患者さん、またはご家族ですか？

- はい
- いいえ

【ご注意】  
通信料はご利用者負担となります。

東和薬品  
(C) TOWA PHARMACEUTICAL CO., LTD.

#### サイトトップへ

詳細内容については  
裏面をご覧ください

#### ロラタジンDS1%「トーフ」

申し訳ございません。

こちらに掲載している情報は、ロラタジンDS1%「トーフ」を服用されている(これから服用される)患者さん、またはご家族を対象に作成したものです。

ロラタジンDS1%「トーフ」を適正に服用していただくことを目的としておりますので、ご利用は対象の方に限定させていただいております。

東和薬品  
(C) TOWA PHARMACEUTICAL CO., LTD.

※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

## ロラタジンDS1%「トローワ」

このお薬は、医師または薬剤師の指示に従い、服用してください。



ロラタジンDS1%「トローワ」は、アレルギー性鼻炎、じんましん、皮膚疾患(湿疹・皮膚炎、皮膚そう痒症)にともなうかゆみの治療に用いられるお薬です。

掲載している情報は、お子様向けの説明内容となっておりますが、このお薬は、成人の方にも処方されます。

[⇒ 次のページへ\(服用前の注意\)](#)

### ● コンテンツメニュー

服用前の注意

<指導・監修>  
獨協医科大学 小児科学  
准教授 吉原重美

より詳細な情報を望まれる場合は、医師または薬剤師におたずねください。

- お問い合わせ
- 個人情報保護
- 利用規約



(C) TOWA PHARMACEUTICAL CO., LTD.

### 服用前の注意

次のような方は、服用前に必ず医師と薬剤師に伝えてください。

- ・以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。
- ・妊娠または授乳中である。
- ・他に薬を使っている(お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、大衆薬も含めて他に使用中の医薬品に注意してください)。

[⇒ 次のページへ\(お水で飲ませるときは…\)](#)

### ● コンテンツメニュー

お水で飲ませるときは…

[⇒ サイトトップへ](#)

- ロラタジンDS1%「トローワ」は甘みをつけたお薬です。

### お水で飲ませるときは…

・小さじ1杯程度(5cc程度)のお水に1回分のお薬を加え、軽くかき混ぜてから飲ませてください。  
このお水の量は目安です。お好みに合わせて調節してください。

・このお薬は、お水に溶けません。お水に混ぜると、口の中がすっきりします。



### お薬を混ぜた場合

- ・飲ませる直前に1回分を混ぜてください。
- ・作り置きしないでください。

[⇒ 次のページへ\(お水で飲みにくいときは…\)](#)

### ● コンテンツメニュー

お水で飲みにくいときは…

[⇒ サイトトップへ](#)

### お水で飲みにくいときは…

・お水かわりに次のような少量の飲みものや食べものと混ぜると、飲みやすくなります。



ヨーグルト(加糖)  
バニラアイスクリーム  
プリン  
牛乳  
ミルクココア

### 飲みにくくするもの

次のようなものと一緒に飲むと、苦くなります。  
お薬の服用前後に飲んでも、苦くなる場合があります。



スポーツドリンク  
酸味のあるジュース  
乳酸菌飲料

### お薬を混ぜた場合

- ・飲ませる直前に1回分を混ぜてください。
- ・作り置きしないでください。

[⇒ 次のページへ\(服用を忘れた時は・服用時の注意\)](#)

### ● コンテンツメニュー

服用を忘れた時は・服用時の注意

[⇒ サイトトップへ](#)

### 服用を忘れた時は

気がついたときにすぐに飲んでください。ただし、次に飲む時間が近いときは、1回とばしてください。2回分を一度に飲んではいけません。

### 服用時の注意

- ・誤って多く服用した場合は医師または薬剤師に相談してください。
- ・医師の指示なしに、自分の判断で服用を止めないでください。

[⇒ 次のページへ\(保管について\)](#)


### ● コンテンツメニュー

保管について

[⇒ サイトトップへ](#)

### 保管について

乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光、湿気を避けて室温(1~30℃)で保管してください。



薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。

### ● コンテンツメニュー

⇒ サイトトップへ

[⇒ サイトトップへ](#)