



トレビアノーム錠 25mg

患者用指導せん変更のお知らせ

平素は、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

この度、トレビアノーム錠 25mg の「患者用指導せん」を変更致しましたのでご案内申し上げます。

記

【包装単位および変更ロット】

PTP100 錠 : Lot. No A014

【変更内容】

2011 年 11 月の「トレビアノーム錠（ベンズブロマロン）適正使用のお願い」及び「使用上の注意改訂のお知らせ」に基づき「患者用指導せん」を変更いたしました。

変更前	トレビアノーム錠25mg/50mg をお飲みになる方へ 必ずお読みください このお薬は、血液中の尿酸を尿中に排泄させて痛風・高尿酸血症を改善するお薬です。 患者さんによっては、このお薬の服用中に肝臓の働きが低下することがありますので、裏面も必ずお読み下さい。 ご不明な点がある場合、さらに詳しく知りたい場合は医師または薬剤師におたずねください。 医療機関名 肝臓の働きが低下したときによく見られる症状 お薬を飲みはじめてから少なくとも6ヵ月間は定期的に肝機能検査を受けてください。 ●食欲がなくなる ●はきけがする ●体がだるくなる(けんたい感) ●お腹が痛くなる、下痢をする ●熱がでる ●尿の色が濃く(褐色)なる ●皮膚や白目が黄色くなる ●発疹がでる ●からだがかゆくなる このような症状に気づいたときは、服用を中止し、すぐに医師または薬剤師に相談してください。 C-4
変更後	トレビアノーム錠 を服用される患者さんへ 必ずお読みください このお薬は、血液中の尿酸を尿中に排泄させて痛風・高尿酸血症を改善するお薬です。 患者さんによっては、このお薬の服用中に肝臓の働きが低下することがあり、主に飲み始めてから6ヵ月以内に多く認められています。裏面も必ずお読みください。 ご不明な点がある場合、さらに詳しく知りたい場合は医師または薬剤師に相談してください。 施設名 肝臓の働きが低下したときによく見られる症状 ●食欲がなくなる ●はきけがする ●体がだるくなる(けんたい感) ●お腹が痛くなる、下痢をする ●熱がでる ●尿の色が濃く(褐色)なる ●皮膚や白目が黄色くなる ●発疹がでる ●からだがかゆくなる このような症状に気づいたときは、服用を中止し、すぐに医師または薬剤師に相談してください。 お薬を飲んでいる期間中は定期的に肝機能検査が行われます。 東和薬品株式会社 2011年11月改訂 (C-5)

以上