


プラシルカスト DS10%「トローワ」の生物学的同等性に関する資料

プラシルカスト DS10%「トローワ」とオノンドライシロップ 10%を、クロスオーバー法によりそれぞれ 2g(プラシルカスト水和物として 200mg)健康成人男子に絶食単回経口投与して血漿中未変化体濃度を測定し、得られた薬物動態パラメータ(AUC、Cmax)について 90%信頼区間法にて統計解析を行った結果、 $\log(0.80)\sim\log(1.25)$ の範囲内であり、両剤の生物学的同等性が確認された。¹⁾



薬物動態パラメータ

	判定パラメータ		参考パラメータ	
	AUC ₀₋₁₀ (ng・hr/mL)	Cmax (ng/mL)	Tmax (hr)	T _{1/2} (hr)
プラシルカスト DS10%「トローワ」	2356±1004	636.5±342.4	2.50±1.09	1.89±0.42
オノンドライシロップ 10%	2548±1093	684.1±344.2	2.49±0.80	1.86±0.60

平均値±標準偏差、n=40

血漿中濃度並びに AUC、Cmax 等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

1) 水山 和之ほか：診療と新薬，2007；44(5)：559-568