


## リスペリドン内用液 1mg/mL「トーワ」の生物学的同等性に関する資料

リスペリドン内用液 1mg/mL「トーワ」とリスパダール内用液 1mg/mLを、クロスオーバー法によりそれぞれ 1mL (リスペリドンとして 1mg)健康成人男子に絶食単回経口投与して血漿中未変化体濃度を測定し、得られた薬物動態パラメータ(AUC、 $C_{max}$ )について 90%信頼区間法にて統計解析を行った結果、 $\log(0.80)\sim\log(1.25)$ の範囲内であり、両剤の生物学的同等性が確認された。<sup>1)</sup>



薬物動態パラメータ

	判定パラメータ		参考パラメータ	
	AUC <sub>0-12</sub> (ng・hr/mL)	$C_{max}$ (ng/mL)	$T_{max}$ (hr)	$t_{1/2}$ (hr)
リスペリドン内用液 1mg/mL 「トーワ」	24.21 ± 16.02	6.426 ± 3.090	0.92 ± 0.33	2.91 ± 1.11
リスパダール内用液 1mg/mL	23.83 ± 16.84	6.453 ± 3.813	0.94 ± 0.29	2.87 ± 1.02

(平均値 ± S.D., n=12)

血漿中濃度並びに AUC、 $C_{max}$ 等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

1) 田中 孝典ほか：診療と新薬. 2008 ; 45(6) : 583-589