

エパルレスタット錠50mg「トーワ」 をご使用の患者さんへ

このお薬は糖尿病の合併症である神経障害による症状（足先のしびれ・痛みなど）を改善するとともに、神経のはたらきの低下をおさえます。医師の指示に従って服用を続けてください。

ご使用にあたって

- ① このお薬は**食事の前**にお飲みください。
- ② このお薬を飲むと**尿の色が黄色～赤色になる**ことがあります。お薬の成分の色によるものなので心配はありません。

このお薬を飲んで発疹、かゆみ、腹痛などの症状に気づいたら、早めに医師または薬剤師に相談してください。また、これらの症状の他にも何か変だなと感じたら医師または薬剤師に相談してください。

（うら面もお読みください）

糖尿病性神経障害について

血糖値の高い状態が続くと体のすみずみに広がる「末梢神経」がうまくはたらかなくなります。これが「糖尿病性神経障害」です。

末梢神経には痛みなどを感じたり、筋肉を動かす「感覚・運動神経」、内臓の動きを調節する「自律神経」があります。

糖尿病を放置すると神経が十分にはたらかなくなり、手足の先のしびれや痛み、立ちくらみ、下痢や便秘を繰り返すなど全身にさまざまな症状が現れます。

「糖尿病性神経障害」の治療で最も重要なことは、血糖コントロール（飲酒や喫煙などの生活習慣の改善を含む）です。症状によっては神経障害を改善するお薬が用いられます。

