

クラリスロマイシンDS小児用10%「トーフ」を 飲みやすくするために

監修：獨協医科大学 小児科学 准教授 吉原重美 先生

このお薬の風味は…

- ・甘みをつけた「いちご風味」です。
- ・このお薬の粒には苦みを防ぐコーティングがされています。



お水で飲ませるときは…

- ・少量のお水（10～20cc）に1回分のお薬を加え、軽くかき混ぜてから飲ませてください。
- ・このお薬は、お水に溶けませんが混ざります。このお水の量は目安です。お好みに合わせて調節してください。



お薬を混ぜた場合…

- ・飲ませる直前に1回分を混ぜてください。
- ・混ぜたお薬は保管しないでください。

■裏面もお読みください

施設名

携帯電話用
お薬の情報



<http://twyh.jp/cla-ds/>

※一部使用できない機種がございます。

クラリスロマイシンDS小児用10%「トーフ」

お水で飲みにくいときは…

- お水のかわりに次のような飲みものや食べものと混ぜると、飲みやすくなります。



バニラ
アイスクリーム



牛乳



ミルクココア



プリン

飲ませた後のポイント

- このお薬は甘く味つけされていますが、口の中に残ったお薬が苦くなる場合があります。お薬を飲ませた後は、すぐにお水を飲ませてあげるとよいでしょう。
- ココアやアイスクリームなどを口に含ませるのも、苦みを防ぐ良い方法です。

次のようなものと一緒に飲むと、苦くなります。お薬の服用前後に飲んでも、苦くなる場合があります。



スポーツ
ドリンク



酸味のある
ジュース



ヨーグルト
(加糖)

