


# シロスタゾールOD錠/錠「トーワ」 を服用されている方へ


この薬は、血液が固まるのを防ぎ、血管を広げ、血液の流れをよくして、足の痛みや冷え等の症状を改善する働きがあります。

この薬は、脳梗塞の症状が落ち着いたあとの再発を抑える働きがあります。

## 血栓ができるのを防ぐ



## 血流を良くする



- この薬を服用した後、血管が広がって血液の流れがよくなり、一時的に頭痛や動悸がすることがあります。

これらの症状が続く場合は、医師または薬剤師に相談してください。

**次のような症状があらわれたら、  
すぐに医師または薬剤師に相談してください。**

- |                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| ● がまんできないほど頭が痛い | ● 苦しいほど動悸がする             |
| ● 胸が痛い          | ● 熱が出たり、咳が出たりする          |
| ● 気分が悪い、吐き気がする  | ● 鼻血が出たり、あざができる<br>やすくなる |
| ● 意識がもうろうとする    |                          |

**次のような場合にはこの薬を服用していることを  
医師・薬剤師にお伝えください。**

- 歯の治療・抜歯、手術、内視鏡検査などを受ける場合  
(血が止まりにくくなることがあります)
- 新たに他の薬を服用する場合  
(作用の強さが変わることがあります)

このほかにも、気になることやわからないことがある場合は、医師または薬剤師に相談してください。

**OD錠を服用されている方へ**

- この薬は水なしでも飲むことができる口腔内崩壊錠(OD錠)です。
- 舌の上で唾液を含ませ軽くつぶしてから、唾液と一緒に飲み込んでください。
  - 水なしで飲むときは、寝たままでは飲まないでください。
  - 普通の薬と同様に、水またはぬるま湯で飲むこともできます。  
どちらの飲み方でも効き目は変わりません。