

# テオフィリン徐放製剤をお飲みになる お子様の保護者の方へ

主な製品名

テオフィリン徐放DS小児用20%「トーワ」



確認してください！

## ○このお薬でみられやすい好ましくない作用（副作用）について

お薬は人によって、目的とする作用以外に、好ましくない作用（副作用）があらわれることがあります。本剤でみられやすい副作用は、**はきけがする**、**食欲がない**、**興奮する**、**寝つきが悪くなる**などの症状です。

## ○発熱したとき

発熱している状態で本剤を飲むと、副作用があらわれやすくなります。**発熱に気がついたら主治医の先生の指示に従ってください。**

発熱時には飲むのをやめて、熱が下がってからまた飲みはじめる。

発熱時には1日の飲む量を減らす。

その他( )

※主治医の先生から受けた指示を忘れないよう、□にチェックしてください。

## ○ほかの先生にお薬をだしていただくとき、薬局でお薬を買うとき

お薬の中には本剤の作用を強めたり、弱めたりするものがあります。飲み合わせにより、副作用があらわれることや、喘息発作を起こしやすくなることがあります。

医師、薬剤師の先生に、お子様が本剤服用中であることをお伝えください。

## ○このような飲ませ方は避けてください！

発作が治まらないから、飲み忘れたからといって**2回分を1度に飲ませないでください**。飲ませる間隔を短くするのも避けてください。副作用があらわれやすくなります。

※副作用があらわれたとき、お子様の様子がいつもと違うなと感じたときには、主治医の先生に相談してください。

東和薬品株式会社