

アジスロマイシン錠「トローワ」を 服用される患者さんへ


1回服用

- アジスロマイシン錠は、クラミジア・トラコマティスという菌による感染症を治療する薬です。医師の指示に従い、正しく服用してください。

※他の感染症を治療する目的で処方される場合もあります。



- 1回の服用で、約10日間作用が持続します。




- 処方されたアジスロマイシン錠は、すべて1度に飲んでください。
- 服用後、1週間たっても症状の改善がみられない場合は、医師または薬剤師に相談してください。
- この薬の重複投与を避けるため、他の医療機関を受診する場合はアジスロマイシン錠を飲んでいただいていたことを伝えてください。

(裏面もお読み下さい)

服用する際は、以下の点に特に注意してください

- この薬の服用により発疹に加え、粘膜(口唇、眼、外陰部)のびらん(ただれ)あるいは水ぶくれ等が起こることがあります。このような症状があらわれた場合は、服用を中止し、すぐに医師または薬剤師に連絡してください。これらの症状は、薬を飲み終わった後でもあらわれることがあります。

- この薬は、人によって腹痛や下痢などの症状があらわれる場合があります。症状がひどい場合は医師または薬剤師に相談してください。



このほかにも、気になることやわからないことがある場合は、医師または薬剤師に相談してください。

施設名