


# アジスロマイシン錠「トーワ」を服用される患者さんへ

3日間用

- この薬は抗生物質です。感染症の原因となる菌の増殖を抑える作用があります。医師の指示に従い、正しく服用してください。



- 3日間飲むと、約7日間作用が持続します。



- 飲み始めて4日目以降でも症状の改善が見られない場合は、医師または薬剤師に相談してください。
- 薬を飲み忘れた場合は、気づいた時にすぐに飲んでください。ただし、次に飲む時間が近い場合は1回とばして、次に飲む時間に1回分を飲んでください。2回分を一度に飲まないでください。
- この薬の重複投与を避けるため、他の医療機関を受診する場合はアジスロマイシン錠を飲んでいたことを伝えてください。

(裏面もお読み下さい)

## 服用する際は、以下の点に特に注意してください

- この薬の服用により発疹に加え、粘膜(口唇、眼、外陰部)のびらん(ただれ)あるいは水ぶくれ等が起こることがあります。このような症状があらわれた場合は、服用を中止し、すぐに医師または薬剤師に連絡してください。  
これらの症状は、薬を飲み終わった後でもあらわれることがあります。



- この薬は、人によって腹痛や下痢などの症状があらわれる場合があります。症状がひどい場合は医師または薬剤師に相談してください。

このほかにも、気になることやわからないことがある場合は、医師または薬剤師に相談してください。

---

施設名



東和薬品株式会社

2013年12月作成 (C-1)