

アトルバスタチン「トローワ」

を服用されている方へ

監修

東京医科大学
名誉教授 高沢謙二先生

この薬について

この薬は、高コレステロール血症の治療薬です。
肝臓でのコレステロール合成を阻害することにより、血液中のコレステロールを低下させます。

この薬を飲むときは、以下の点にご注意ください

1. 筋肉の副作用として、ごくまれに^{おうもんきんゆうかいししょう}横紋筋融解症を起こすことがあります。
 - 飲み始めてから、**筋肉が痛い、手足の力が入らない、尿の色が濃い(赤褐色になる)等の症状**に気づかれた場合は、すぐに医師または薬剤師に連絡してください。

^{おうもんきんゆうかいししょう}

横紋筋融解症とは

筋肉障害により、手足や全身の筋肉痛、しびれや脱力(感)などの症状があらわれ、筋肉の成分(ミオグロビン)が血液中に流れ出る病気です。また、尿の色が濃く、赤褐色の尿がみられることがあります。

これらの症状を放置していると、尿が出にくくなるなど腎臓の機能が低下することがあります。

2. 劇症肝炎等の肝炎、肝機能障害や黄疸があらわれることがあります。

● 悪心・嘔吐、けん怠感、皮膚や白目が黄色くなる等の症状があらわれた場合には、医師または薬剤師に連絡してください。

- 副作用はどんな薬にもありますが、早期に発見し適切な処置を行えば大事に至ることはほとんどありません。
- 薬を服用して他にも体調がおかしいと感じたら、医師または薬剤師に相談してください。

3. 医師に指示された用法・用量を守ってください。

● 誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。

その他の注意点

- 光の当たらない涼しいところに、湿気を避けて保管してください。
- 誤って飲んでしまわないよう、こどもの手の届かないところに保管してください。

施設名