

アナストロゾール錠「トローワ」を 服用される患者さんへ

Tw
200

1

実物大

このお薬は、乳がんの増殖を抑える薬です。毎日きちんと服用を続けることが大切です。主治医の指示なしにご自身でお薬を減らしたり、止めたりせず、主治医の指示に従ってください。

服用方法

主治医の指示に従い、1日1錠を毎日飲んでください。お薬は包装(PTPシート)から取り出して、コップ1杯くらいの水と一緒に飲んでください。

飲み忘れた場合

飲み忘れた場合は、気がついたときにすぐに飲んでください。ただし、次の服用時間が近い場合は、1回分をとばして次の通常の服用時間に1回分を飲むようにしてください。絶対に2回分を一度に飲まないでください。

保管方法

- ・こどもの手の届かないところに保管してください。
- ・直射日光の当たらない、涼しいところに、湿気を避けて保管してください。

裏面も必ずご覧ください

東和薬品株式会社

副作用について

このお薬を服用すると、下記のような副作用があらわれることがあります。

このほかにも気になる、つらい、煩わしいと思う症状があらわれましたら、主治医や薬剤師に相談してください。

手指のこわばり、手や膝の痛み(関節痛)



朝、手指の関節に硬い感じや腫れぼったい感じがあり動かしにくくなったり、手や膝などの関節が痛む。

骨折しやすくなる(骨粗鬆症)



骨の密度が低くなり、骨折しやすくなる。

ほてり



急にたくさんの汗がでたり、顔がほてる。

施設名

