

クエチアピン錠 / 細粒「トローワ」

を服用される方とご家族の方へ

この薬を服用する際は、以下の点に特に注意してください。

- この薬は、血糖値を上昇させることがあるため、定期的に血糖値を測定する場合があります。特に、家族に糖尿病の方がいる方、高血糖や肥満傾向の方は注意してください。
- 以下のような症状があらわれた場合は、すぐに医師または薬剤師に連絡してください。



血糖値が高くなったときにあらわれる症状です

- この薬を服用中に、体重が増加することがあります。体重が増加し始めた場合は、医師または薬剤師に相談してください。
- このほかにも、気になることやわからないことがある場合は、医師または薬剤師に相談してください。

この薬の注意点

- この薬は、毎日飲み続けることが大切です。体調がよくなったと自分で判断して飲むのを止めたりせずに、医師の指示通りに飲んでください。
- この薬を飲み始めてからしばらくの間、立ちくらみやめまいなどが起こることがあります。これらの症状があらわれた場合は、医師または薬剤師に相談してください。
- この薬は、人によっては眠くなることがあります。薬を飲んだ後は、自動車の運転など危険を伴う機械の操作は避けてください。
- 誤って飲んでしまわないよう、子どもの手の届かないところに保管してください。



施設名