


# セフジトレンピボキシル細粒 小児用10%「トーフ」の上手な飲ませ方

監修: 獨協医科大学 小児科学 准教授 吉原重美 先生

このお薬は基本的には、粉のまま少量のお水で飲ませるお薬です。  
そのまま飲むことを嫌がるお子様のために、上手な飲ませ方をご紹介します。

## このお薬の味は…

・甘みをつけた「オレンジ風味」です。



## 飲みにくい場合は 少量のお水と混ぜて飲ませることもできます

・少量のお水(20cc程度)と1回分のお薬を、軽くかき混ぜてから飲ませてください。

このお水の量は目安です。お好みに合わせて調節してください。

・このお薬は、お水に溶けませんが混ざります。

### ● 飲ませた後のポイント

・口の中に残ったお薬が苦くなることがあります。

お薬を飲ませた後は、すぐにお水を飲ませてあげるとよいでしょう。

・ココアやアイスクリームなどを口に含ませるのも苦みを防ぐ良い方法です。



■裏面もお読みください

施設名

携帯電話用  
お薬の情報



<http://www.towayakuhin.co.jp/m/cefd-fg/>

## お水で飲ませにくいときは…

- お水のかわりに次のような飲みものや食べものと混ぜると、飲みやすくなります。(薬局にてボランティア12名の協力による。)



- 小さじ2～3杯程度(10cc程度)に1回分のお薬を加え、軽くかき混ぜてから飲ませてください。

この食品の量は目安です。お好みに合わせて調節してください。

### ●飲ませた後のポイント

- 飲みやすくする食品で飲ませたとしても、口の中に残ったお薬が苦くなることがあります。お薬を飲ませた後は、すぐにお水を飲ませてあげるとよいでしょう。

次のような飲みものと一緒に飲むと、苦くなります。  
お薬の服用前後に飲んでも、苦くなることがあります。



## お薬を混ぜた場合

- 飲ませる直前に1回分を混ぜてください。
- 混ぜたお薬は保管しないでください。

## 保管について

- 光や湿気を避けて、室温で保存してください。

