

ドネペジル 塩酸塩 OD錠「トーフ」

を服用される方とご家族・介護者の方へ

このお薬について

認知症の症状の進行を遅らせるお薬です。

症状に変化が見られなくても、患者さん本人や家族の判断で服用を中止したり、量を変更したりせず、医師の指示通りに飲んでください。

このお薬は水なしでも飲むことができる口腔内崩壊錠(OD錠)です。

普通のお薬と同様に、水またはぬるま湯で飲むこともできます。

水なしで飲む場合

○舌の上でだ液を含ませてから、だ液(または少量の水)と一緒に飲み込んでください。

○水で飲んだ場合と効き目は変わりません。

○このお薬を飲むときは、寝たままの状態で飲まないように、体を起こしてください。起き上がることが困難な場合は、少し上体を起こして飲んでください。

※お薬が食道に引っかかったり、気管に入ってむせることがあります。

○お薬を飲み忘れた場合は気づいたときにすぐに飲んでください。ただし、飲むべき時間から半日以上経過している場合は、1回分をとばして、次から指示通りに飲んでください。2回分を一度に飲まないでください。

このお薬を飲んでいる間は次の点にご注意ください

- お薬の飲み始めや量が増えた時に以下のような症状が現れることがあります。

軽い吐き気をもよおす。 便が軟らかくなる。

食欲がなくなる。 イライラして落ち着かなくなる。

- ※このような症状に気づいたら、医師または薬剤師に相談してください。

- 服用中のお薬がある場合や、誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。

このお薬は以下のように保管してください

- 湿気を避けて、直射日光の当たらない涼しいところに保管してください。
- こどもの手の届かないところに保管してください。

このほかにも、気になることやわからないことがある場合は、医師または薬剤師に相談してください。

施設名

携帯電話用お薬の情報



<http://twyh.jp/don-od/>

※一部使用できない機種がございます。