

ビカルタミド「トローワ」を 服用されている方へ

この薬について

この薬は前立腺がんの治療薬です。
前立腺がんが進む原因である、男性ホルモンの作用をブロックすることで、がん細胞の増殖を抑えます。

服用にあたっての注意事項

● 医師の指示に従い、**1日1錠**を毎日決められた時間に飲んでください。

● 飲み忘れたときは、気がついたときにすぐに飲んでください。

ただし、次に飲む時間が近い場合は、1回分とばして次の通常の時間に1回分を飲むようにしてください。

絶対に2回分を一度に飲まないでください。



● 症状が良くなった場合でも、医師の指示なしに、自分で薬を減らしたり、止めたりせず、医師の指示に従ってください。

裏面も必ずご覧ください

次の点に注意してください

- 高齢の方や肝障害のある方は、より注意して医師の指示を守って飲んでください。
- 以前に**薬を飲んで発疹などが出たことがある方、肝臓に病気のある方**は飲む前に医師に相談してください。



その他、次の点に留意してください

<他の薬を飲んでいる場合>

- 他の薬を飲んでいる場合は、薬局で買った薬を含め医師に伝えてください。
- 他の病院を受診する場合や薬局で薬を買う場合は、必ずビカルタミドを飲んでいることを伝えてください。

<薬は以下のように保管してください。>

- 光の当たらない涼しいところに保管してください。
- こどもの手が届かないところに保管してください。

気になる症状が現れた場合は医師や薬剤師に相談してください。

施設名



東和薬品株式会社

2016年8月改訂(C-2)