# プラミペキソール塩酸塩 OD 錠 「トーワ」 を服用される方とご家族の方へ

## この薬を正しく服用するため、飲む前に必ずお読みください。

- ●飲み方は、必ず医師の指示に従ってください。自分の判断で飲む量を減らしたり、飲むのを止めないでください。
- ■この薬を飲むと、眠くなったり、 前兆もなく急に眠り込んでしまうこと (突発的睡眠)、まためまいや立ちくらみ、 ふらつきが起こることがあります。





#### 突発的睡眠について

食事中や会話の最中などに急に眠り込んでしまうことがあります。また、このような症状は、薬を飲み始めて1年以上経過してから見られる場合もあります。

- しょう どう せい ぎょ しょう がい
- ●衝動制御障害や、以下のようなことが起こったら、すぐに医師または 薬剤師に連絡してください。
  - ・急激な眠り込み
  - 幻覚や妄想
  - めまいや立ちくらみ
  - 発熱や意識がぼんやりした状態
  - ・筋肉のこわばりがひどい状態

衝動制御障害(病的賭博、強迫性購買、病的性欲亢進、暴食等) 社会的に不利な結果を招くにもかかわらず、ギャンブルや過剰で無計画な買い 物を持続的に繰り返したり、病的に性欲や食欲が亢進したりすること。

### プラミペキソール塩酸塩OD錠「トーワ」

### この薬は水なしでも飲むことができる口腔内崩壊錠(OD錠)です。

普通の薬と同様に、水またはぬるま湯で飲むこともできます。

#### 水なしで飲む場合

- 舌の上でだ液を含ませ軽くつぶしてから、だ液と一緒に飲み 込んでください。
- 水で飲んだ場合と効き目は変わりません。
- 水なしで寝たまま飲まないでください。(薬が食道に引っかかり炎症を起こすおそれがあります。)

#### その他の注意点

- ●薬を飲み忘れた場合は気がついたときにすぐに飲んでください。 ただし、次に飲む時間が近いときは、1回とばしてください。 絶対に2回分を1度に飲まないでください。
- 誤って飲んでしまわないよう、子どもの手の届かないところに保管 してください。
- 光の当たらない涼しいところに、湿気を避けて保管してください。
- 気になることやわからないことがある場合は、医師または薬剤師 に相談してください。

施設名