

フルボキサミンマレイン酸塩錠「トーワ」


を服用される患者さんとご家族の方へ

このお薬について

- このお薬は、効果が現れ始めるまである程度日数がかかることがあります。十分な効果を得るために、ご自分の判断で飲むのをやめたり、量を減らしたりせず医師の指示通りに飲み続けてください。
- このお薬は、人によっては飲み始めの頃に、吐き気をもよおすことがあります。多くの場合、吐き気は次第に軽くなりますので、ご自分の判断で飲むのをやめたりせず、医師または薬剤師に相談してください。
- このお薬は、あなたに処方されたお薬です。他の人にあげたり、もらったりしないでください。

このお薬の飲み方

このお薬はかみ砕かずに、コップ1杯の水またはぬるま湯と一緒に飲んでください。
(かみ砕くと苦味があり、舌がしびれることがあります。)



裏面もご覧ください。

このお薬の注意点

このお薬を飲む際には、以下の点に特に注意してください。

また、気になることやわからないことがある場合は、医師または薬剤師に相談してください。

- 18歳以下の大うつ病性障害のある人がこの薬と同じようなお薬を飲んだ場合、有効性が確認できなかったとの報告があります。18歳未満の大うつ病性障害のある人とご家族の方は、医師と十分に相談してください。
- このお薬を飲んでいる間、特に飲み始めや飲む量を変更したときに、不安感が強くなり死にたいと思うことがあります。
また、イライラして人に対して攻撃的になったりすることがあります。
ご自身の状態に変化を感じた場合には、ご家族や医師または薬剤師に相談してください。
ご家族の方は、患者さんの状態の変化について観察し、変化が見られた場合には医師または薬剤師に相談してください。
- このお薬は、人によっては眠くなることがあります。お薬を飲んだ後は自動車の運転など危険を伴う機械の操作は避けてください。
- ほかのお薬を飲んでいる場合は、薬局・薬店で買ったお薬も含め、医師または薬剤師に相談してください。

