

ミルナシプラン塩酸塩錠「トーフ」

を服用されている方とご家族の方へ


この薬について

- この薬は、体調がよくなったと自己判断して使用を中止したり、量を減らしたりせず、医師の指示通りに飲み続けてください。
- ほかの薬を飲んでいる場合は、薬局・薬店で買った薬も含め、医師または薬剤師に相談してください。



この薬の飲み方

この薬はかみ砕かずに、コップ1杯の水またはぬるま湯と一緒に食後に飲んでください。
(かみ砕くと苦味があります。)



裏面もご覧ください。

この薬の注意点

この薬を飲む際には、以下の点に特に注意してください。

また、気になることやわからないことがある場合は、医師または薬剤師に相談してください。

- 18歳以下の大うつ病性障害のある人がこの薬と同じような薬を飲んだ場合、有効性が確認できなかったとの報告があります。18歳未満の大うつ病性障害のある人とご家族の方は、医師と十分に相談してください。
- この薬を飲んでいる間、特に飲み始めや飲む量を変更したときに、不安感が強くなり死にたいと思うことがあります。
また、イライラして人に対して攻撃的になったりすることがあります。
ご自身の状態に変化を感じた場合には、ご家族や医師または薬剤師に相談してください。
ご家族の方は、患者さんの状態の変化について観察し、変化が見られた場合には医師または薬剤師に相談してください。
- 自動車の運転など危険を伴う機械の操作が必要な場合は、必ず医師に相談し、十分注意してください。この薬は、人によっては眠くなることがあります。また、薬の飲み始め、他の薬からの切り替え時、飲む量を変更した時などは眠気・めまいが発生しやすいためできるだけ運転を控え、これらの症状を自覚した場合は、絶対に運転を行わないでください。

