


使用にあたり、保存方法など次の点に注意してください

- 専用の袋に入れ、光を避けて室温(1~30℃)で保存してください(冷蔵庫での保存も可能です)。
- 開封後、4週間経過した場合は、残った液は使用しないでください。
- 開封後、液がにごるなど異常を感じた場合、残った液は使用しないでください。
- こどもの手が届かないところに保存してください。

次の症状に注意してください

- 角膜(黒目の部分)の表面が炎症を起こすことがありますので、目がしめたり、かすんだり、かゆみや痛みがつづくような場合は、すぐに主治医または薬剤師に相談してください。
- その他、点眼後に異常を感じた場合は、すぐに主治医または薬剤師に相談してください。

施設名



この指導せんの内容は音声コードにしています。
活字文書読み上げ装置に適すことで、音声として
聞くことができます。



東和薬品株式会社

2012年9月改訂(C-3)

ラタロプロスト点眼液 0.005%「トロー」の使用法

指導・監修 川崎市立多摩病院 病院長
聖マリアンナ医科大学 眼科学 教授 上野聰樹 先生

適切にお使いいただくためにお読みください

このお薬は **目薬** です
(点眼用のみにお使いください)
光を避けて室温で保存してください



実物大

使用方法については中面をお読みください。

